

## 2022 年江苏省育婴员职业技能竞赛理论题库

### 单选题（1-363）：

- 1、“为人民服务”是社会主义职业道德的( B),是职业道德的核心。
  - A、一种表现
  - B、集中表现
  - C、个人行为
  - D、集体行为
- 2、职业道德原则和规范是在( A)总结和概括出来的。
  - A、职业活动实践中
  - B、长期积累中
  - C、与职工讨论中
  - D、人与人的关系中
- 3、要根据个体的差异,有针对性地教育引导,发挥各自的优势,开发各自的潜能,切不可进行(D )。
  - A、横向的比较
  - B、纵向的比较
  - C、针对性的比较
  - D、盲目比较
- 4、婴幼儿头占身长( A)。
  - A、1/4
  - B、1/2
  - C、1/8
  - D、1/6
- 5、( C )具有以下特点:乳牙逐渐出齐,食物转换但消化功能弱;语言、动作及思维发展迅速,活动范围扩大,但危险识别和自身保护力差,易发生事故;免疫力仍低,传染病发生率高。
  - A、新生儿期
  - B、婴幼儿期
  - C、幼儿期
  - D、学龄前期
- 6、婴幼儿各系统发育快慢与不同年龄(B )有关。
  - A、生长速度
  - B、生理功能
  - C、心理发育
  - D、营养

7、婴幼儿心理发展的每一年龄阶段特点,都具有相对的稳定性。从前一阶段向后一阶段过渡的时间可能略有早晚,但阶段(A )。

- A、 不能跳跃,顺序是一致的
- B、 可以跳跃,顺序是不一致的
- C、 不能跳跃,顺序是不一致的
- D、 可以跳跃,顺序是一致的

8、婴儿半岁左右能够坐起来的时候,可以较好地完成(A )。

- A、 手眼手协调的活动
- B、 各种动作
- C、 各种活动
- D、 各种游戏

9、1岁以后的婴幼儿记忆过程缺乏(C) 。

- A、 想象力
- B、 主动性
- C、 明确的目的
- D、 创造性

10、感知动作思维是指思维过程离不开(D )的思维方式。

- A、 实物
- B、 表象
- C、 情景
- D、 直接感知的事物和操纵事物的动作

11、3岁以前的婴幼儿想象的内容也比较简单,一般是他所看到成人或其他大孩子的某个简单行为的重复,属于(B )的范围,缺乏创造性。

- A、 再认
- B、 再造想象
- C、 创造想象
- D、 回忆

12、在良好教育环境下,2岁半的婴幼儿能集中注意(A )。

- A、 3~5 钟
- B、 5~8 分钟
- C、 8~10 钟
- D、 10~20 分钟

13、( B)在人一生的发展中起着至关重要的作用。它不排斥亲子关系,也不能由亲子关系来代替。

- A、 亲子关系

- B、 玩伴交往关系
- C、 朋友关系
- D、 群体关系

14、(C) 婴幼儿在不断扩大生活范围、不断增长社会经验和能力,不断发展言语的过程中,逐步把握作为一个社会人的自我。

- A、 从出生到一岁
- B、 从一岁到两岁
- C、 从第二年到满 3 岁
- D、 从 3 岁到 4 岁

15、0~3 岁婴幼儿的情绪和情感,对其(B)起着至关重要的作用。

- A、 性格发展
- B、 生存与发展
- C、 动作发展
- D、 认知发展

16、婴幼儿在玩弄玩具,摆弄物品,奔向某个目标的爬行和走路中,形成初步的运动能力的掌握和运动的目的性,为婴幼儿(B)的产生准备了条件。

- A、 想象力
- B、 意志力
- C、 创造力
- D、 协调力

17、(A)为言语的发生期。包括咿呀学语,开始听懂别人说的话和自己说话三个阶段。

- A、 0~1 岁
- B、 1~2 岁
- C、 2~3 岁
- D、 3~4 岁

18、婴儿首先发展的是头部、躯体、双臂、双腿的动作,以后才是灵巧的手部小肌肉动作以及准确的视觉动作等。是动作发展(D)的规律。

- A、 从上部动作到下部动作
- B、 从整体动作到分化动作
- C、 从正向中心粗大动作到反向两端精细动作
- D、 从大肌肉动作到小肌肉动作

19、婴儿对母乳以外食物的(D)。

- A、 耐受性较低,也不容易发生过敏
- B、 耐受性较高,也容易发生过敏
- C、 耐受性较高,也不容易发生过敏
- D、 耐受性较低,也容易发生过敏

20、营养素提供热能,下面(B )说法是错误的。

- A、1g 蛋白质提供热能 4cal
- B、1g 碳水化合物提供热能 9cal
- C、1g 脂肪提供热能 9cal
- D、1g 碳水化合物提供热能 4cal

21、正常婴幼儿每日摄入碳水化合物产生的热能占总能量的( C )。

- A、 30%
- B、 40%
- C、 50%
- D、 60%

22、一岁婴幼儿每日供给的荤菜大约为(A )。

- A、 50g
- B、 40g
- C、 30g
- D、 20g

23、婴幼儿每日供给的蛋白质为(B )。

- A、 50g
- B、 40g
- C、 30g
- D、 20g

24、婴幼儿长期脂肪缺乏会容易发生(A )。

- A、 脂溶性维生素缺乏症
- B、 体重和身高增加增快
- C、 腹泻、酸中毒
- D、 食欲减退、消化不良

25、碳水化合物能节省的( B)消耗量和协助脂肪氧化。

- A、 脂肪
- B、 蛋白质
- C、 碳水化合物
- D、 无机盐和微量元素

26、钙的作用,下例( A)说法不正确。

- A、 参与血浆凝血因子的产生
- B、 构成骨骼、牙齿
- C、 镇静神经
- D、 参与血液凝固过程

27、维生素的共同特点是(C )。

- A、 能在人体内合成
- B、 不存在于食物中
- C、 绝不能缺少
- D、 人体需要量很多

28、膳食纤维来源于(B )。

- A、 动物性食物
- B、 植物性食物
- C、 水
- D、 以上都是

29、水的主要来源为( D)。

- A、 摄入液体
- B、 固体食物中的水分
- C、 食物氧化及组织代谢所产生的水分
- D、 以上都是

30、婴儿期添加食物应遵循下列原则:(B )。

- A、 由稀到稠, 由少到多, 由细到粗, 由甜到咸
- B、 由稀到稠, 由少到多, 由细到粗, 由一种到多种
- C、 由稀到稠, 由少到多, 由甜到咸, 由一种到多种
- D、 由稀到稠, 由甜到咸, 由细到粗, 由一种到多种

31、儿童计划免疫包括基础免疫和加强免疫, (D )不是减少相应传染病发生的关键措施。

- A、 预防
- B、 控制
- C、 消灭
- D、 治疗

32、如果过多地注射疫苗, 反而会使免疫力降低, 甚至无法产生免疫力, 出现(C )。

- A、 免疫抑制
- B、 免疫消失
- C、 免疫麻痹
- D、 免疫消退

33、打针后(D )应避免剧烈活动。

- A、 一周内
- B、 4~5 天
- C、 3~4 天
- D、 2~3 天

34、百白破疫苗不能预防(B )传染病。

- A、白喉
- B、白癜风
- C、百日咳
- D、破伤风

35、婴幼儿期时体格生长发育最迅速,必须有丰富的易于消化的各种(D)满足需要。

- A、食物
- B、营养品
- C、高蛋白食物
- D、营养素

36、自我生活能力包括(D)等。

- A、睡眠、进食
- B、排便、沐浴
- C、游戏、户外活动
- D、以上都是

37、婴幼儿洗澡水温应保持(D)。

- A、30~32℃
- B、33~35℃
- C、35~36℃
- D、37~40℃

38、婴幼儿皮肤护理的注意事项:(A)。

- A、奶量充足时口腔是清洁的,禁忌用纱布擦洗口腔黏膜
- B、奶量充足时口腔是有菌的,禁忌用纱布擦洗口腔黏膜
- C、奶量充足时口腔是清洁的,可以用纱布擦洗口腔黏膜
- D、奶量充足时口腔是有菌的,可以用纱布擦洗口腔黏膜

39、婴幼儿乳痂的处理:(A)。

- A、新生儿头部皮脂腺分泌较旺盛,应经常清洗
- B、新生儿头部皮脂腺分泌不旺盛,应经常清洗
- C、新生儿头部皮脂腺分泌较旺盛,不用经常清洗
- D、新生儿头部皮脂腺分泌不旺盛,不用经常清洗

40、婴幼儿衣服宜柔软、宽大,内衣用(C)。

- A、毛线制品
- B、尼龙制品
- C、纯棉布制品
- D、涤棉制品

41、购买家用电器后要认真阅读产品说明书,注意使用( A )。

- A、方法
- B、电压和功率
- C、标准
- D、期限

42、家用电器的电源线绝缘破损时,要用( B )包扎好。

- A、创可贴
- B、绝缘胶布
- C、伤湿止痛膏
- D、药用胶带

43、使用家用电器时,要注意( D )。

- A、有完整可靠的电源线插头
- B、不许将导线直接插入插座
- C、不要用双脚插头插三角插
- D、以上都是

44、不要在电线上( D ),以防绝缘破损漏电造成触电。

- A、放风筝
- B、晒衣服
- C、装设天线
- D、以上都是

45、有关让婴幼儿知道生活中哪些物品导电的说法正确的是:( C )。

- A、凡是金属制品都是不导电的
- B、水也是不导电的
- C、不用湿布擦拭电器
- D、湿手可以接插头

46、食品安全指食品( A )。

- A、无毒、无害
- B、无添加剂
- C、符合一般营养要求
- D、经过转基因处理

47、人体正常的情况下，从血液中把一些有害物质解毒、排泄出去，是靠人体的(D )进行的。

- A、 肝脏
- B、 泌尿系统
- C、 肾脏
- D、 以上都是

48、亲手为宝宝制作食品，尽可能选用新鲜的富含( B )的食物。

- A、 无机物质
- B、 有机物质
- C、 矿物质
- D、 维生素

49、饮白开水不光能满足儿童对水的生理需要，还能为他们提供一部分(A )。

- A、 矿物质和微量元素
- B、 蛋白质
- C、 脂肪
- D、 碳水化合物

50、甜食、冷饮中含有大量糖分，其出众的口感主要依赖于(B )。

- A、 调味品
- B、 添加剂
- C、 防腐剂
- D、 以上都是

51、若常饮易拉罐饮料，必然造成(C )摄入过多。

- A、 铜
- B、 铅
- C、 铝
- D、 锡

52、( B)长期过多地沉积在人体，可能会引发某种疾病，最常见的就是肾结石。

- A、 蛋白质或脂肪
- B、 矿物质和微量元素
- C、 碳水化合物
- D、 膳食纤维

53、长期进食精细食物，不仅会因减少( A)的摄入而影响神经系统发育。

A、B 族维生素          B、维生素 C          C、维生素 A          D、维生素 D

54、检测显示,膨化食品虽然口味鲜美,但从成分结构看,属于( D)的食品。

- A、高油脂
- B、高热量
- C、低粗纤维
- D、以上都是

55、咖啡因还会破坏儿童体内的维生素,引起( B)。

- A、维生素 C 缺乏症          B、维生素 B1 缺乏症
- C、维生素 B2 缺乏症          D、维生素 B6 缺乏症

56、儿童不宜食用的营养滋补剂包括:含有( D )等营养品。

- A、人参、鹿茸
- B、阿胶
- C、冬虫夏草、花粉
- D、以上都是

57、长期偏食某种食物,会导致某些“毒性”成分在体内( C )。

- A、聚集
- B、扩散
- C、蓄积
- D、丢失

58、五颜六色汽水的主要成分是人工合成( D)、碳酸水,经加充二氧化碳气体制成的。

- A、甜味剂
- B、香精
- C、色素
- D、以上都是

59、购买肉制品、腌腊制品慎购( C )的食品。

- A、规范的市场
- B、展销会
- C、游商(无固定营业场所、推车销售)销售
- D、“放心店”

60、不得带( B)等火种。

- A、酒精
- B、火柴或打火机

- C、汽油
- D、鞭炮

61、纸张、木头或布起火时,可用(B )来扑救。

- A、土
- B、水
- C、沙泥
- D、干粉灭火器

62、如果发现火灾发生,最重要的是报警,这样才能(D )。

- A、及时扑救
- B、控制火势
- C、减轻火灾造成的损失
- D、以上都是

63、着火时身处楼房的应(D )。

- A、紧闭门窗
- B、隔断火路
- C、等待救援
- D、以上都是

64、履行劳动合同,提高职业技能,执行劳动安全卫生规程,遵守劳动职业道德是(B )的内容。

- A、劳动权利
- B、劳动义务
- C、劳动争议
- D、劳动就业

65、发展生产,节制生育、广开就业门路,拓宽就业渠道、办好劳动就业服务企业,扩大就业安置是(D )的内容。

- A、劳动权利
- B、劳动义务
- C、劳动争议
- D、劳动就业途径

66、( B)的履行应遵循亲自履行的原则。

- A、劳动权利
- B、劳动合同
- C、劳动就业
- D、劳动义务

67、未成年工的特殊保护是指根据未成年工的( C)的特点,对未成年工在劳动过程中特殊权益的保护。

- A、 年龄
- B、 性格
- C、 生理心理及身体状况身体尚未定型
- D、 发育

68、社会保险主要包括:( D)。

- A、 劳动保险、医疗保险
- B、 工伤保险、失业保险
- C、 养老保险、医疗保险
- D、 养老保险、工伤保险、医疗保险和失业保险

69、用人单位与劳动者约定服务期的,不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的( B)。

- A、 职务
- B、 劳动报酬
- C、 待遇
- D、 声誉

70、用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在( C )内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。

- A、 一周内
- B、 十日内
- C、 十五日内
- D、 30 日内

71、妇女对依照法律规定的夫妻共同财产享有与其配偶平等的占有、使用、收益和处分的权利,不受双方( D )的影响。

- A、 约定
- B、 是否生育
- C、 对家庭贡献
- D、 收入状况

72、对准备结婚的男女双方,可能患影响结婚和生育的疾病进行医学检查是( D )的内容。

- A、 婚前卫生指导
- B、 婚前卫生咨询
- C、 婚前心理指导
- D、 婚前医学检查

73、为新生儿生长发育、哺乳和护理提供医疗保健服务并建立联系卡,是( D)的内容。

- A、 母婴保健指导
- B、 孕妇、产妇保健
- C、 胎儿保健
- D、 新生儿保健

74、经未成年人监护人的(B ),允许他人使用未成年人的肖像,未成年人有权取得适当的报酬。

- A、 口头承诺
- B、 书面同意
- C、 口头应允
- D、 协商同意

75、国家依法保护未成年人的智力成果和荣誉权不受侵犯,是未成年人享有的(C)。

- A、 财产所有权
- B、 受赠权
- C、 知识产权
- D、 继承权

76、我国《未成年人保护法》在規定对未成年人进行(D )的同时,还规定学校应对未成年人进行社会生活指导和青春期教育。

- A、 学校教育
- B、 学业教育
- C、 基本课程教育
- D、 德育、智育、体育、美育、劳动教育

77、劳动权利是指有劳动能力的公民享有要求劳动就业的机会和(D )的权利。

- A、 获取工资
- B、 获得报酬
- C、 获得回报
- D、 按劳取酬

78、专供婴幼儿的主、辅食品必须符合(D )卫生行政部门制定的营养、卫生标准和管理办法的规定。

- A、 县级
- B、 市级
- C、 省级
- D、 国务院

79、餐具、炊具和盛直接入口食品的容器,使用前必须(B ),炊具、用具用后必须洗净,保持清洁。

- A、 检查是否干净
- B、 洗净、消毒
- C、 擦洗干净
- D、 洗干净

80、不符合卫生标准和卫生管理办法的食品添加剂,不得( D )。

- A、 出售
- B、 买卖
- C、 上市
- D、 经营、使用

81、教育是社会主义现代化建设的基础,国家保障教育事业(D )。

- A、 提前发展
- B、 同步发展
- C、 稳步发展
- D、 优先发展

82、国家实行学前教育、初等教育、中等教育、高等教育的(C )制度。

- A、 终身教育
- B、 全民教育
- C、 学校教育
- D、 义务教育

83、哺乳的期间,排卵会暂停,也可以达到( B)避孕的效果。

- A、 人工
- B、 自然
- C、 药物
- D、 器械

84、根据婴幼儿的年龄段选择合适的配方奶粉,( D )的婴幼儿可选用第一阶段的配方奶粉,( )的婴幼儿 可选用第二阶段的配方奶粉,( )的婴幼儿可选用第三阶段的配方奶粉。

- A、 0~3 个月、4~6 个月、6~12 个月
- B、 0~4 个月、4~12 个月、12~18 个月
- C、 0~6 个月、6~12 个月、12~24 个月
- D、 0~6 个月、6~12 个月、12~36 个月

85、纯母乳喂养往往不能满足(D )个月婴儿的生长发育需要。

- A、 1~2
- B、 3~4
- C、 4~6
- D、 6~8

86、婴儿 10 个月后,添加软饭、馒头、制作精细的(A )。

- A、 动物性及植物性食物
- B、 动物性食物
- C、 动物性或植物性食物
- D、 植物性食物

87、辅食增加的量要适合孩子的(B )。

- A、 喜好
- B、 胃容量和消化吸收能力
- C、 味觉
- D、 视觉

88、哺乳姿势正确会出现如下情况( B)。

- A、 乳头出现疼痛
- B、 婴儿的体重如期增长
- C、 妈妈和婴儿都没有舒适感
- D、 喂了很长时间, 婴儿看起来还是饿

89、婴儿出生后立即吸吮母亲乳头, 每侧乳房至少喂(B )。

- A、 3 分钟
- B、 5 分钟
- C、 10 分钟
- D、 15 分钟

90、沸水消毒时加水至器具全部没入水中, 煮沸(D )分钟, 其中煮奶嘴 3 分钟。

- A、 3~4
- B、 4~5
- C、 5~8
- D、 5~10

91、测试奶的温度的方法:( A)。

- A、 滴奶在成人的手背或手腕上
- B、 滴奶在儿童的手背或手腕上
- C、 用温度计测试
- D、 以上都可以

92、不要强迫婴儿每餐一定喝完奶瓶里的奶, 强迫喂养勉强只会让婴儿( D)。

- A、 哭泣溢奶
- B、 吐奶
- C、 厌食腹泻
- D、 以上都是肥胖

93、喂奶后将婴儿缓慢竖起抱, 头靠母亲肩部, ( B)拍婴儿背部, 让哺乳时吸入的空气( )地排出。

- A、 重重、 缓缓
- B、 轻轻、 缓缓
- C、 轻轻、 快快
- D、 重重、 快快

94、 婴幼儿厌食、 拒食, 只要耐心地喂, 过( D )就会恢复。

- A、 5~7 天
- B、 4~5 天
- C、 3~4 天
- D、 2~3 天

95、 每次换尿布后, 特别是在大便后应以( D )清洁臀部, 再用护臀霜涂抹, 以防发生尿布疹(即红臀)。

- A、 毛巾
- B、 纸张
- C、 清水
- D、 婴儿护肤柔湿巾

96、 多数婴幼儿 1 岁时已长出( D ), 接着再长出第一乳磨牙。

- A、 2 上 2 下共 4 颗乳牙
- B、 2 上 4 下共 6 颗乳牙
- C、 2 上 6 下共 8 颗乳牙
- D、 4 上 4 下共 8 颗乳牙

97、 红臀会引起皮肤发红, 以下不是红臀表现的是( C )是错误的。

- A、 臀部发红
- B、 大腿内侧及外生殖器发红
- C、 背部发红
- D、 会阴部发红

98、 尿布用( D )清洗干净, 以免残留物刺激皮肤而导致臀红。

- A、 清水
- B、 温水
- C、 冷水
- D、 热水

99、 在给女婴洗臀部的时候一定要坚持“从前往后”的原则, 即从( B )清洗。

- A、 尿道口→肛门→阴道口
- B、 尿道口→阴道口→肛门
- C、 阴道口→尿道口→肛门
- D、 肛门→阴道口→尿道口

100、如果婴儿的白带发生异常,颜色(B ),像脓液,有异味,量多,则有可能感染了炎症。

- A、 透明
- B、 发黄或发白的原则
- C、 浑浊
- D、 红色

101、平时尿尿便便后用(D )擦干净,洗澡的时候可以用( )擦拭大腿根部、外阴部的皮肤皱褶。

- A、 纸张、旧棉布
- B、 纸张、干净的棉花
- C、 婴幼儿专用湿纸巾、旧棉布
- D、 婴幼儿专用湿纸巾、干净的棉布花

102、新生儿洗澡宜在喂奶前( C )进行,或在喂奶后( )进行。

- A、 30 分钟、30 分钟~1 小时
- B、 1 小时、1~1.5 小时
- C、 30 分钟、1~1.5 小时
- D、 1 小时、30 分钟~1 小时

103、洗身体:左手托住婴儿头、肩部;右手托住婴儿臀部并引导婴儿的(D )首先进入水中,然后逐渐降低身体的其他部位,进入浴盆。

- A、 头部
- B、 背部
- C、 臀部
- D、 脚

104、洗澡结束后,用棉棒蘸一点婴儿油,在(C )轻轻转 2~3 圈,清洁出污垢与水珠。

- A、 口腔
- B、 脐部
- C、 外耳道、鼻腔
- D、 眼睛

105、每次洗澡时间不宜超过分钟(C )。

- A、 30
- B、 20
- C、 10
- D、 5

106、为孩子进行任何一种动作,皆需(D )。

- A、 耐心
- B、 轻柔
- C、 细心

D、 轻柔和细心

107、清洁工具应选用消毒过的纱布或棉棒、棉球,且使用次数以( C )为限。

- A、 三次
- B、 二次
- C、 一次
- D、 数次

108、为预防奶瓶性龋齿,要避免婴幼儿含着( C )睡觉。

- A、 双耳杯
- B、 安慰奶嘴
- C、 奶瓶
- D、 手指

109、洗净手指,将无菌纱布缠在食指头上蘸点清洗米水(第二道)轻轻地抹擦婴幼儿的牙床( C )。

- A、 以清洁牙床
- B、 预防牙周炎、牙龈炎
- C、 会减轻宝宝出牙的疼痛
- D、 预防龋齿

110、培养良好的二便习惯,有利于婴幼儿( D )的发展。

- A、 大运动能力
- B、 精细动作
- C、 认知能力
- D、 社会行为

111、睡前玩的时间过长,,会使婴幼儿神经系统精神不能很好地被( D )下来。

- A、 强制
- B、 控制
- C、 压制
- D、 抑制

112、有时婴幼儿喜欢吸吮手指可以不予干预,这对稳定婴幼儿( D )起到了一定的作用。

- A、 自身情感
- B、 注意力
- C、 自控能力
- D、 自身情绪

113、关于提出训练二便的时间和方式,以下哪种说法是错误的( A )。

- A、 让婴幼儿有一定的压力
- B、 婴幼儿的膀胱有控制能力
- C、 能够听懂和配合成人的抱姿与口语提示
- D、 给予鼓励和表扬

114、 婴幼儿二便照护, 后的清洁正确的做法是注意事项(C )。

- A、 意外大小便要批评指正
- B、 对婴幼儿二便的信号不做反应
- C、 大小便控制要因人而异
- D、 要求婴幼儿二便后自行清洁

115、 换尿布的正确照护方法是卫生习惯:(C )。

- A、 每天固定时间换尿布
- B、 每次更换需用清水洗臀部
- C、 更换前成人用清水和肥皂洗手
- D、 更换时成人要严肃认真

116、 鞋子应选择具有优良的透气性和吸汗功能的, 还应注意鞋底的(D)等。

- A、 软硬
- B、 厚薄
- C、 是否防滑、 轻便
- D、 以上都是

117、 宝宝脚的表面(D )少, 保温能力差, 脚的保暖关键在于锻炼和穿好鞋袜。

- A、 神经
- B、 肌肉
- C、 血管
- D、 脂肪

118、 亲子游戏可以使婴幼儿获得(D )。

- A、 安抚
- B、 亲切感
- C、 开阔他的视野
- D、 以上都是

119、 不要将孩子独自留在公共场所游戏, 孩子要在成人(B )以内并随时跟着。

- A、 5m
- B、 视线
- C、 成人伸手可及范围

D、 安全范围

120、带婴幼儿出门前可先了解一下当日的(A ),并根据目的地的具体情况选择合适的交通工具。

- A、 天气、温度
- B、 路途
- C、 路况
- D、 交通情况

121、穿连体衣的错误步骤是:(C )。

- A、 先把所有的扣子都解开
- B、 让宝宝平躺在衣服上,脖子对准衣领的位置
- C、 先穿裤腿,再穿手臂
- D、 然后扣上所有的纽扣即可

122、传统“蜡烛包”(D )。

- A、 限制婴儿胸廓的运动
- B、 影响胸廓发育
- C、 影响肺脏发育
- D、 以上都是

123、婴幼儿出行如果是喂奶粉,可准备(D ),便于冲泡奶粉。

- A、 足够的奶粉
- B、 装有开水的保温壶
- C、 准备好凉开水
- D、 以上都是

124、宝宝坐在婴儿车里,面部不可用(A)遮盖住。

- A、 尼龙纱巾
- B、 帽子
- C、 遮阳伞面罩
- D、 口罩

125、使用儿童安全座椅的正确方法是:(B )。

- A、 9~18kg 的儿童,应使用前向式汽车座椅
- B、 9~18kg 的儿童,应使用后向式汽车座椅
- C、 9~18kg 的儿童,应使用前向式儿童安全座椅
- D、 9~18kg 的儿童,应使用后向式儿童安全座椅

126、“消毒”是(A )重要措施之一。

- A、 切断传播途径

- B、防止传染病扩散
- C、防止传染病蔓延
- D、以上都是

127、清洁可消除大量潜在的( A )。

- A、病原微生物
- B、细菌
- C、病毒
- D、寄生虫

128、使用安全、有效的方法对日常生活环境作全方位的消毒,能( D )。

- A、提高生活素质
- B、预防疾病
- C、保障健康
- D、以上都是

129、定期对婴幼儿玩具进行( D )。

- A、清洗
- B、消毒
- C、暴晒
- D、以上都是

130、被消毒物品要全部浸入水中。一次消毒的物品不应放置太多,以不超过容量的( D )为宜。

- A、1/4
- B、1/2
- C、2/3
- D、3/4

131、怕湿怕烫的毛类玩具:可在烈日下暴晒( D )小时,借助太阳紫外线的照射,将细菌杀灭。

- A、1~2
- B、2~3
- C、3~4
- D、4~6

132、在清洗尿布时用热水比较好,温度以( B )为宜。

- A、30~40℃
- B、40~50℃
- C、50~60℃
- D、60~70℃

133、洗涤尿布时不要使用(D )。

- A、 含酶的洗衣粉
- B、 柔软剂
- C、 去污粉
- D、 以上都是

134、托育机构家具一般每周用含氯消毒液或使用经国家有关部门检验合格的( C)进行擦拭一次。

- A、 洗洁精
- B、 洗衣粉
- C、 家具消毒剂
- D、 肥皂粉

135、日光中紫外线,除有杀菌作用,提高皮肤的防御能力,还可以使皮肤内的 7-脱氢胆固醇转化为维生素 D,促进机体对(A )的吸收,预防佝偻病的发生。

- A、 钙、磷
- B、 锌
- C、 铁
- D、 维生素 D

136、空气浴锻炼在对于(D )的情况下应禁止锻炼。

- A、 身体特别虚弱
- B、 各种急慢性疾病
- C、 代偿不全的心瓣膜病
- D、 以上都是

137、不要( B)晒太阳,尽量让阳光直接接触皮肤。

- A、 隔着纱巾
- B、 隔着玻璃
- C、 戴着帽子
- D、 在树荫下

138、婴幼儿游泳禁忌症适用于:( D)。

- A、 患有婴幼儿疾病需接受治疗者
- B、 小于 32 周的早产儿
- C、 体重低于 2000g 体重的低出生体重儿
- D、 以上都是

139、注意室内温度一定不能低于( B),因为抚触时宝宝最好全身裸露。

- A、 20℃
- B、 25℃
- C、 30℃
- D、 35℃

140、婴幼儿时期由于自身免疫功能尚未发育完善,易患(D )疾病。

- A、 心血管系统
- B、 神经系统
- C、 内分泌系统
- D、 呼吸系统和消化系统

141、体温计使用完毕用( C)棉擦拭备用。

- A、 安尔碘
- B、 碘伏
- C、 75%酒精
- D、 95%酒精

142、出现疑难病症,需要到权威医院就诊时,应事先了解有关专家或专业(C )。

- A、 门诊的位置和就诊情况
- B、 门诊的位置和就诊要求
- C、 门诊的时间和就诊情况
- D、 门诊的时间和就诊要求

143、喂药前必须按标签核对所服药物,包括(D )。

- A、 药名
- B、 药品质量
- C、 应用剂量
- D、 以上都是

144、鼻腔用药:家长抱住孩子,使头尽量后仰并向患儿侧稍倾斜,再将药直接滴入鼻腔,并保持此体位( B)分钟。

- A、 1~2
- B、 2~3
- C、 3~5
- D、 5~10

145、给婴幼儿喂悬浮液时,不要掺水,应等服下药后再喂(D )白开水。

- A、 1~2 口
- B、 几口
- C、 少量
- D、 等量

146、当婴幼儿发生磕碰时立即从冰箱中取出冰块,用布包裹后敷在血肿处,以(B )。

- A、 避免红肿形成
- B、 减少皮下出血
- C、 减轻疼痛
- D、 促进血液循环

147、婴幼儿粗大动作的发展有利于平衡感的建立,对宝宝(B )的培养和独立性的形成具有促进作用。

- A、 自尊心
- B、 自信心
- C、 同情心
- D、 爱心

148、(B )为步行前时期,仍然以移动运动为主,包括独坐、爬行、扶站、姿势转换、花样爬(障碍爬)、扶走等。

- A、 0~6 个月      B、 7~12 个月      C、 13~18 个月      D、 19~36 个月

149、婴儿最早的动作发生在(B ),其次在躯干,最后是下肢。

- A、 上肢
- B、 头部
- C、 手指
- D、 脚趾

150、在进行大动作发展指导训练时,要尽量营造快乐的游戏氛围。这遵循了是粗大动作训练的(C )。

- A、 循序渐进原则
- B、 适宜性原则
- C、 趣味性原则
- D、 优先发展原则

151、婴幼儿两手的动作发展顺序,标志着(D )和感觉统合的成熟程度。

- A、 手眼协调
- B、 动作
- C、 感知觉
- D、 大脑神经、骨骼肌肉

152、婴幼儿(C )的发展必须在大动作发展基础上才能得到发展。

- A、 语言
- B、 认知
- C、 精细动作
- D、 情感

153、(D)是串、二指捏、套叠、旋转、镶嵌的动作发展时期。

A、0~6个月 B、7~12个月 C、13~18个月 D、19~24个月

154、精细动作的发展有一个由简单到复杂的过程,这是大脑发育逐渐成熟的过程,因此为婴幼儿提供的玩具学具也要符合遵循由简单到复杂的特点。这遵循了是(A)的描述。

- A、递进性原则
- B、趣味性原则
- C、操作性原则
- D、刺激性原则

155、婴幼儿的(C)能力是婴幼儿与同伴和成人之间沟通的工具。

- A、运动
- B、动手
- C、听说
- D、想象

156、看电视时瞳孔没有放大,眼睛要一直盯着屏幕,视线(D),而视线移动正是阅读活动中关键的技巧。

- A、慢速移动
- B、快速移动
- C、会移动
- D、不会移动

157、2岁左右会说2~3或3~4个字组成的句子,把名词和动词组合在一起被称为(B)。

- A、单字句阶段
- B、电报句阶段
- C、简单句阶段
- D、复合句阶段

158、进行婴幼儿指认游戏,同一时间内指认的品种不能太多,(A),当宝宝认识了,再更换另一种类。

A、每次1种 B、每次2种 C、每次3种 D、每次4种

159、认知能力是(B)的基础。

A、识字 B、智力 C、算数 D、动作 160、(B)的婴儿,会用手触摸看到的物体,使用简单的工具,用手的运动增长经验,用手表达意思等。

A、0~12个月 B、13~24个月 C、25~36个月 D、37~48个月

161、( A )婴幼儿有了大小知觉的恒常性,2岁左右开始有了大小的概念。

- A、1岁      B、2岁      C、3岁      D、4岁

162、职业道德是指从事一定职业的人,在工作或劳动过程中,应该遵循的与其职业活动紧密联系的( A )。

- A、道德规范的总和  
B、道德  
C、规范的总和  
D、道德的总和

163、职业道德可以提高行业的( C )。

- A、知名度  
B、可信度  
C、信誉度  
D、规范度

164、育婴员是在( D )中为0~3岁婴幼儿综合发展提供全方位指导和服务的专业人员,承担着一种社会责任。

- A、早教机构中  
B、家庭中  
C、社区中  
D、家庭、社区和托育早教机构中

165、0~3岁婴幼儿从吃奶到吃普通食物;从躺卧状态、完全没有随意动作到用手操纵物体和直立行走;从完全不能说话到能用语言交流;从软弱的个体到相对独立的个体,非常需要成人的( B )。

- A、重点保护  
B、精心养护,并在养护过程中融合教育  
C、精心呵护  
D、尽早教育

166、婴幼儿的身心发展有其独立的特征,并不是一个缩小的成人,身体所以在比例上( C )。

- A、有差异  
B、没有明显的变化  
C、也有明显的变化  
D、没有差异

167、初步学习判断是非,是婴幼儿( D )。

- A、学习的任务  
B、游戏的任务  
C、养育的任务

D、 生长发育的任务

168、( B)的特点是:生长发育迅速,营养要求高,以乳食为主,但消化功能差,易发生消化紊乱和营养不良。

- A、 新生儿期
- B、 婴幼儿期
- C、 幼儿期
- D、 学龄前期

169、婴幼儿生长发育有连续性和阶段性,年龄越小体格增长越快。出生后( A)生长最快。

- A、 6 个月内
- B、 12 个月内
- C、 18 个月内
- D、 24 个月内

170、年龄阶段性是指在婴幼儿心理发展的全过程中,表现出一些在( C )不同的年龄阶段特点。

- A、 形式上
- B、 数量上
- C、 质量上
- D、 内容上

171、婴幼儿从6个月到3周岁左右,手在视野范围内完成操纵、摆弄物品的活动,都是各种( C )飞快发展的时期。

- A、 认知感觉能力
- B、 动手能力
- C、 感知觉能力
- D、 视觉能力

172、( A)是婴幼儿思维方式的准备时期。凭借手摸、体触、口尝、鼻闻、耳听、眼看,发展起感觉、知觉能力。

- A、 0~1 岁
- B、 1~2 岁
- C、 2~3 岁
- D、 3~4 岁

173、3岁前建立的玩伴关系,常常是( A)的活动,要建立群体的玩伴交往关系还有一定的困难。

- A、 一对一
- B、 一对二
- C、 一对三
- D、 一对多

174、人类在进化过程中所获得的基本情绪,大约有8~10种。它们是( C )。

- A、 同时出现的
- B、 先后出现的
- C、 逐步出现的
- D、 同步出现的

175、婴幼儿早期已经表现出来的个人特点,就是气质。比如( B)。

- A、 对人的面孔的喜爱
- B、 睡眠规律、活动水平、是否爱哭、哭声大小
- C、 喜欢让人抱
- D、 手舞足蹈

176、婴幼儿的第一年是动作能力发展最迅速的时期。动作发展包括( C)两个方面。

- A、 上肢动作和下肢动作
- B、 躯干动作和四肢动作
- C、 粗大动作和精细动作
- D、 前庭平衡和大动作

177、婴儿体内营养素的( C )。

- A、 储备量相对大,适应能力也低
- B、 储备量相对小,适应能力也高
- C、 储备量相对小,适应能力也低
- D、 储备量相对大,适应能力也高

178、产热营养素包括( C )。

- A、 碳水化合物、膳食纤维、水
- B、 无机盐微量元素、维生素
- C、 蛋白质、脂肪、碳水化合物
- D、 以上都是

179、婴幼儿所必需的营养素包括( A)。

- A、 7 种
- B、 6 种
- C、 5 种
- D、 3 种

180、蛋白质用于婴幼儿维持( A )。

- A、 各种组织新陈代谢
- B、 体温
- C、 血糖水平
- D、 营养运输

181、婴幼儿脂肪的作用( D)。

- A、 防止体热的消散
- B、 保护脏器不受损伤
- C、 有利于脂溶性维生素的吸收
- D、 以上都是

182、碳水化合物是( C )供应的主要来源。

- A、 蛋白质
- B、 脂肪
- C、 热能
- D、 维生素

183、人体内除碳、氢、氧、氮以外的元素称矿物质,包括( B )。

- A、 蛋白质、脂肪
- B、 无机盐和微量元素
- C、 碳水化合物
- D、 维生素

184、各种维生素有不同生理代谢功能,大多起调控作用,与酶关系密切,( D )。

- A、 但都能提供能量,也不能非构成人体组织部分
- B、 但都能提供能量,也能构成人体组织部分
- C、 但都不能提供能量,也能构成人体组织部分
- D、 但都不能提供能量,也不能非构成人体组织部分

185、婴幼儿水的需要量约为( B ) mL/(kg · d)。

- A、 50~100
- B、 100~150
- C、 150~200
- D、 200~250

186、幼儿期孩子们体格发育速度放慢,但脑的发育加快,因此饮食中应注意( A )的供给。

- A、 脂肪
- B、 普通蛋白质
- C、 优质蛋白质
- D、 碳水化合物

187、预防接种后会出现轻重不同的反应,主要表现为打针部位会出现红、肿、痒、痛,称为( D )。

- A、 全身反应
- B、 过敏反应
- C、 高热反应
- D、 局部反应

188、空腹饥饿时不宜打预防针,以免发生( C )等严重反应。

- A、 抽搐

- B、 过敏
- C、 低血糖
- D、 高热

189、乙肝疫苗接种对象接种月龄错误的是(C )。

- A、 0 个月
- B、 一个月
- C、 四个月
- D、 六个月

190、部分母乳喂养或人工喂养婴幼儿则应正确选择配方奶( A)。

- A、 母乳化配方奶粉
- B、 全脂奶粉
- C、 儿童成长奶粉
- D、 羊奶粉

191、不属于促进幼儿语言发育与大脑运动能力的发展的方法是(D )。

- A、 游戏
- B、 讲故事
- C、 唱歌
- D、 自行进食

192、婴幼儿夏天要( A)洗澡。

- A、 天天
- B、 隔天
- C、 2-3 天
- D、 3-4 天

193、尿布应选择(D )。

- A、 吸湿性强
- B、 透气性好
- C、 柔软
- D、 以上都是

194、新生儿头部已形成的乳痂,可用煮熟后晾凉的食用植物油闷 24 小时,再用(C )。

- A、 毛巾擦洗
- B、 清水清洗
- C、 棉棒轻轻擦拭
- D、 以上都是

195、在不超过( D)的允许负荷的情况下,方可使用购买的家用电器。

- A、 家庭电源插座

- B、 保险丝
- C、 电表和导线
- D、 以上都是

196、安装家用电器时,要注意电器的使用环境。不要将家用电器安装在( D)的环境中。

- A、 干燥
- B、 无热源
- C、 无灰尘
- D、 有易燃和腐蚀性气体

197、电线断线落地,不要靠近,6~10kV的高压线,应至少离开电线落地点(C )远,并及时报告有关部门修理。

- A、 3m
- B、 5m
- C、 10m
- D、 15m

198、有关教育婴幼儿学会看安全标志正确的是:( B)。

- A、“红色”用来标志指示、安全状态、通行
- B、“黄色”用来标志注意危险
- C、“蓝色”表示禁止、停止的信息
- D、“绿色”表示指令、必须遵守的规定

199、有一些食品,细菌超标,对孩子一过性的影响可表现为(D )。

- A、 呕吐
- B、 腹泻
- C、 腹痛体重不增长
- D、 以上都是

200、根据不同月龄婴幼儿的发育特点,选择合适的食物( D),使婴幼儿保持良好的食欲,获得充足的营养。

- A、 品种
- B、 质地
- C、 口味
- D、 以上都是

201、坚果类食品(B )含量高,质地坚硬,婴幼儿不易嚼碎,不易消化。

- A、 蛋白质
- B、 脂肪
- C、 碳水化合物
- D、 矿物质

202、烧开的自来水冷却到(B ),此时水的生物活性增加,最适合人的生理需要。

- A、 35~45℃
- B、 25~35℃
- C、 15~25℃
- D、 5~15℃

203、过食冷饮会引起儿童(D)。

- A、 胃肠道内温度骤然下降
- B、 局部血液循环减缓
- C、 影响对食物中营养物质的吸收和消化
- D、 以上都是

204、有调查显示,易拉罐装饮料比瓶装饮料铝的含量高出(B )倍。

- A、 5~6
- B、 4~5
- C、 3~6
- D、 2~5

205、儿童经常食用膨化食品,会影响正常饮食,导致多种营养素得不到保障和供给,易出现(C )。

- A、 蛋白质缺乏
- B、 维生素缺乏
- C、 营养不良
- D、 肥胖

206、咖啡因有刺激性,能刺激胃部蠕动和胃酸分泌,常饮含有咖啡印因饮料的儿童容易导致(C)。

- A、 肠梗阻
- B、 急性腹膜炎
- C、 慢性胃炎
- D、 急性胃炎

207、食物中的某些成分可使人体细胞发生(B )。

- A、 应急反应
- B、 中毒反应
- C、 全身反应
- D、 局部反应

208、过量色素和香精进入儿童体内后,容易沉着在他们未发育成熟的消化道黏膜上,造成(D )。

- A、 食欲下降和消化不良
- B、 影响新陈代谢

- C、影响体格发育
- D、以上都是

209、安全购买食品要注意看经营者是否有( A ),其主体资格是否合法。

- A、营业执照
- B、足够经营场所
- C、经营场所卫生状况
- D、按照卫生要求进行生产

210、许多生的食品,特别是家禽、肉类及未经消毒的牛奶常被( D )污染,彻底加热可杀灭。

- A、细菌
- B、病毒
- C、寄生虫
- D、病原体

211、婴幼儿安全防火基本要求( A )。

- A、不得玩火
- B、不得用火柴
- C、不得点火
- D、不得燃放鞭炮

212、炒菜时油锅起火,迅速将锅盖紧紧盖上,使锅里的油火因缺氧而熄灭,不可用( A )扑救。

- A、水
- B、土
- C、沙泥
- D、干粉灭火器

213、全国任何地区,向( C )报告火警的电话号码都是一样的。

- A、公安机关
- B、医疗急救
- C、消防部门
- D、交通急救

214、着火时身处楼房的,要注意( D )。

- A、不要盲目乱跑
- B、不要跳楼逃生
- C、可以躲到居室里或者阳台上
- D、以上都是

215、劳动者义务包括( A )等内容。

- A、 履行劳动合同,提高职业技能、执行劳动安全卫生规程
- B、 平等就业和选择职业、取得劳动报酬、休息、休假
- C、 获得劳动、安全、卫生保护
- D、 接受职业培训技能、享受社会保险和福利

216、国家促进就业原则、平等就业原则、双向选择的( C )的内容。

- A、 劳动权利
- B、 劳动义务
- C、 劳动就业原则
- D、 劳动争议

217、( D )是确立劳动关系和法律关系的形式。

- A、 劳动权利
- B、 劳动义务
- C、 劳动就业
- D、 劳动合同

218、国家保障妇女享有与男子平等的( C )。

- A、 人生权利
- B、 经济权利
- C、 政治权利
- D、 生存权利

219、婚前保健服务包括以下内容 D( )。

- A、 疾病治疗、生育状况检查、健康检查
- B、 婚前心理指导、疾病治疗、生育状况检查
- C、 生育状况检查、婚前心理指导、健康检查
- D、 婚前卫生指导、婚前卫生咨询、婚前医学检查 220、对孕育健康后代以及严重遗传性疾病和碘缺乏病等地方病的发病原因、治疗和预防方法提供医学意见。是(A )的内容。

- A、 母婴保健指导
- B、 孕妇、产妇保健
- C、 胎儿保健
- D、 新生儿保健

221、《母婴保健法》第三十一条规定:医疗保健机构按照( D )卫生服务部门的规定,负责其职责范围内的母婴保健工作,建立医疗保健工作规范,提高医疗技术水平,采取各种措施方便群众,做好母婴保健服务工作。

- A、 县
- B、 市
- C、 省
- D、 国务院

222、隐私权是指未成年人享有的(B ),禁止他人非法干涉的权利。

- A、 个人缺点不被别人知晓
- B、 个人信息缺陷不被别人知晓
- C、 个人生活不被公众知晓
- D、 个人行为不被公众知晓

223、未成年人接受的赠款、赠物归属未成年人所有。任何人,包括未成年人的父母或其他监护人,不得以该未成年人未成年为由将该款、物据为己有。这是未成年人享有的( B)。

- A、 财产所有权
- B、 受赠权
- C、 知识产权
- D、 继承权

224、我国(A )在規定对未成年人进行德育、智育、体育、美育、劳动教育的同时,还规定学校应对未成年人进行社会生活指导和青春期教育。

- A、 《未成年人保护法》
- B、 《母婴保健法》
- C、 《妇女权益保障法》
- D、 《劳动合同法》

225、主食品系指含有婴幼儿生长发育所需的营养素的(A )。

- A、 主要食品
- B、 辅助食品
- C、 添加食品
- D、 补充食品

226、目前我国允许使用并制定有(A )的仪器添加剂有防腐剂、抗氧化剂、发色剂、漂白剂、酸味剂、凝固剂、疏松剂、增稠剂、消泡剂、着色剂、乳化剂、品质改良剂、抗结剂、香料、营养强化剂、酶制剂、鲜味剂等 20 多类。

- A、 国家标准
- B、 化工标准
- C、 卫生标准
- D、 地方标准

227、国家建立科学的(C )系统。

- A、 学业
- B、 学习
- C、 学校

D、 学制

228、母乳不但(D )婴儿的免疫能力,保护婴儿免于感染,预防腹泻、呼吸道感染,更能( )婴儿的过敏体质。

- A、 提高、提高
- B、 降低、降低
- C、 降低、提高
- D、 提高、降低

229、配方奶粉是婴幼儿的较为理想的(B )食品。

- A、 保健
- B、 替代
- C、 辅助
- D、 必备

230、孩子从吃(A )的过程就是体现从稀到稠原则的最好例子。

- A、 米汤→稀粥→稠粥→软饭
- B、 米汤→稀粥→软饭→稠粥
- C、 米汤→稠粥→稀粥→软饭
- D、 米汤→软饭→稀粥→稠粥

231、婴儿出生后2~7天,每1~2小时喂一次,间隔时间不超过(A )。

- A、 3小时
- B、 2.5小时
- C、 2小时
- D、 1.5小时

232、哺乳时喂的时候妈妈一定要将婴儿抱紧,让他能闻到你身上的气味,以增加他的(C )。

- A、 食欲
- B、 舒适感
- C、 安全感
- D、 以上都是

233、当发现婴儿溢奶时应(D ),防止呛奶。

- A、 立即将婴儿的头偏向一侧,或取侧卧位
- B、 轻拍其背部
- C、 使奶液从口角流出
- D、 以上都是

234、婴儿的大便一般是(C )。

- A、 条状、黄色、水分不多
- B、 糊状、绿色、水分不多
- C、 糊状、黄色、水分不多

D、 糊状、黄色、水分较多

235、外环境的(C )也可出现眼屎急剧增多。

- A、 干燥
- B、 变化
- C、 感染
- D、 刺激

236、下面( B)不是产生红臀的主要原因。

- A、 便后没有及时更换潮湿的尿布
- B、 便后清洗未及时涂护臀霜
- C、 质地粗糙尿布的刺激
- D、 腹泻造成大便次数增多

237、“从前往后”的清洗顺序不能避免(C )的发生。

- A、 尿道感染
- B、 内外阴感染
- C、 尿布疹
- D、 外阴炎

238、如果白带增多呈乳凝状,阴部发痒,有异味,还出现尿急、尿频、尿痛的症状,看上去发红,就有可能感染上了( D)。

- A、 滴虫
- B、 霉菌
- C、 淋病
- D、 以上都是

239、待婴儿再大一些,包皮与龟头完全分开之后,爸妈再协助婴儿翻开包皮清洗,而且(C )洗一次就行。

- A、 每天
- B、 每 2-3 天
- C、 偶尔
- D、 每周

240、洗澡时的水温宜保持在( D)。

- A、 32~34℃
- B、 34~36℃
- C、 36~38℃
- D、 38~40℃

241、若头皮上有污垢,可在洗澡前将(C )涂抹在宝宝头上,这样可使头垢软化而易于去除。

- A、 洗发水
- B、 动物油
- C、 婴儿油

D、 BB 霜

242、为婴儿做秽物清理,虽看似简单,但若( C),往往难以进行下去,甚至引起孩子哭闹。

- A、 时间不对
- B、 方式不对
- C、 方法错误
- D、 孩子不配合

243、清理眼屎的消毒棉球应在( B)中浸湿,并将多余的水分挤掉。

- A、 清水
- B、 温开水或淡盐水
- C、 开水
- D、 75%酒精

244、患有严重的结膜炎想要彻底改善眼屎,则必须用( D )及棉花棒冲洗。

- A、 清水
- B、 75%酒精水
- C、 葡萄糖水
- D、 生理食盐水

245、如果婴幼儿一定要含着奶瓶才能入睡,必须先清洁奶瓶奶嘴,并且只能装( D )。

- A、 生理食盐水
- B、 葡萄糖水
- C、 奶水
- D、 白开水

246、有些出牙咀嚼环和冷却过的、凉的东西碰到了牙床会让宝宝( D)。

- A、 感到疼痛,加深他的痛苦
- B、 感到舒适,减轻他的疼痛
- C、 感到疼痛,加深他的烦躁
- D、 感到舒适,减轻他的烦躁

247、婴儿若流鼻涕水,建议使用( A )清洁鼻腔。

- A、 吸鼻器
- B、 消毒纱布清理
- C、 棉花棒清理
- D、 以上都行

248、每个婴幼儿自身气质不同, 家庭环境不同, 睡眠(C )也不一样。

- A、 姿势
- B、 时间
- C、 规律
- D、 深度

249、婴幼儿睡眠充足的标准是(B )。

- A、 清晨需唤醒
- B、 精力充沛
- C、 不爱动
- D、 体重不增

250、睡眠时机体的( B)等多种生理活动处于较高水平。

- A、 循环
- B、 内分泌
- C、 呼吸
- D、 泌尿

251、日常生活发生变化, 不影响婴幼儿睡眠的是 (A)

- A、 出门
- B、 更换奶粉
- C、 移住新屋
- D、 换新保姆

252、不属于婴幼儿二便的卫生习惯是(C )。

- A、 学会向成人表示便意
- B、 自己脱裤子
- C、 随时随地排便
- D、 使用卫生纸, 洗手

253、带着宝宝走动, 也是建立情感的第一步, 同时也促进其(B )等的发展。

- A、 心智生理
- B、 人际交往
- C、 感情
- D、 脂肪

254、竖抱婴幼儿的动作要领:(B )。

- A、 先将婴幼儿抱直, 趴在你的胸部上
- B、 胸腹部贴着你的前胸
- C、 一只手臂绕过婴幼儿的背部护住对侧的肩膀

D、 另一只手托住婴幼儿的腰部

255、 婴幼儿出行最好是去离家近空气新鲜的地方, 如( C)。

- A、 商场
- B、 影院
- C、 公园
- D、 超市

256、 外出时婴幼儿大部分的时间都被背着、 抱着或坐在婴儿车上, 所以一定要携带( B) 来作为婴幼儿的交通工具。

- A、 私家车
- B、 婴儿背带或推车
- C、 公交车
- D、 电动车

257、 脱套头衫的错误步骤:( B)。

- A、 先把衣服卷到颈部
- B、 抓住宝宝的胳膊, 轻轻地拉出胳膊
- C、 用拇指把衣服撑开, 把手伸进衣服内侧撑着衣服
- D、 把衣服顺利穿过这样宝宝的脖子才能够顺利穿过

258、 用背带兜抱婴幼儿连续使用不超过( C) 个小时为宜。

- A、 4
- B、 3
- C、 2
- D、 1

259、 当婴幼儿坐到车内后应固定好( C) 。

- A、 车子前进方向
- B、 开关
- C、 安全带
- D、 以上都是

260、 使用儿童安全座椅的正确方法:( A)。

- A、 体重低于 9kg 的儿童, 应使用后向式儿童安全座椅
- B、 体重低于 9kg 的儿童, 应使用前向式儿童安全座椅
- C、 体重低于 9kg 的儿童, 应使用后向式汽车座椅
- D、 体重低于 9kg 的儿童, 应使用前向式汽车座椅

261、 环境( B) 还直接影响婴幼儿的身心健康成长。

- A、 是否安全
- B、 好坏
- C、 是否温馨
- D、 是否嘈杂

262、常用的清洁方法有(D )。

- A、 水洗
- B、 机械去污
- C、 去污剂去污
- D、 以上都是

263、室内维持整洁、无尘、空气新鲜,室温维持在(A )。

- A、 22~24℃
- B、 23~25℃
- C、 24~26℃
- D、 25~28℃

264、消毒前的准备:餐后将(D )彻底洗净,将奶嘴里外洗刷干净,再用清水冲洗干净。

- A、 奶瓶
- B、 奶嘴
- C、 配件
- D、 以上都是

265、空气浴锻炼时的室温应逐渐下降,一般(C )下降 1℃,最低室温 12~14℃。

- A、 每天
- B、 隔天
- C、 每 3~4 天
- D、 每周

266、在进行日光浴前,应先进行(A )的空气浴。

- A、 5~7 天
- B、 3~5 天
- C、 2~3 天
- D、 1~2 天

267、游泳圈在使用前要进行安全检查:( D)。

- A、 型号是否匹配
- B、 保险扣是否安全
- C、 双气道充气均匀,是否漏气
- D、 以上都是

268、抚触腹部:两手依次从宝宝的右下腹至上腹向左下腹,呈(B )按摩。

- A、 逆时针方向
- B、 顺时针方向
- C、 左右方向

D、 上下方向

269、乳母用药,乳汁中可含有浓度较低的药物,一般对婴幼儿影响不大,但有些药物在乳汁中含量较大,可影响婴儿,因此乳母用药应( D)用药。

- A、 严格控制
- B、 严格按说明书
- C、 不能随意
- D、 在医生指导下

270、应在(D )等情况后休息半小时再测体温。

- A、 吃饭
- B、 喝水
- C、 运动出汗
- D、 以上都是

271、喂药前先准备好温度适宜的(D ),将已溶化好的药物用小勺子混匀。

- A、 茶水
- B、 饮料
- C、 盐水
- D、 温水

272、饭前服的药需在饭前( C )服药。

- A、 10 分钟
- B、 20 分钟
- C、 30 分钟
- D、 60 分钟

273、少数孩子被蜇伤后会出现反应,需要紧急治疗(A )。

- A、 过敏
- B、 高热
- C、 红肿热痛
- D、 中毒

274、在进行大动作发展指导训练时,除了达到动作发展的目的,还需要培养婴幼儿(C )。

- A、 勇敢
- B、 毅力
- C、 对运动的乐趣
- D、 运动的技能

275、从用满手抓握到用拇指与其他四指对握,再到食指与拇指对捏,是婴幼儿(A )发展的顺序。

- A、 精细动作
- B、 认知
- C、 自理能力

D、大动作

276、婴幼儿精细动作练习要结合日常生活进行,做到(C)。

- A、娱乐化、情境化、生活化、
- B、娱乐化、情境化、专门化
- C、生活化、具体化、游戏化
- D、情境化、专门化、娱乐化

277、在婴儿期,非口语表达主要依靠(D)。

- A、喊叫
- B、哭闹
- C、比划
- D、眼神、身体姿势及动作

278、进行婴幼儿指认游戏,指认一种物品(D),才能进行大脑神经连接,建立永久记忆。

- A、只要1次
- B、要反复2次
- C、要反复3次
- D、要反复多次

279、婴儿(B)时认识红色、黄色两种颜色,并能认识一些如圆形、方形、三角形等基本的形状。

- A、1岁
- B、2岁
- C、3岁
- D、4岁

280、职业道德具有(D)的规范性。

- A、操作
- B、服务
- C、态度
- D、纪律

281、职业道德的内容表现为某一职业所形成的特有的(B)和习惯。

- A、职业表现、职业特征、职业特色
- B、职业心理、职业品质、职业传统
- C、职业心理、职业表现、职业特征
- D、职业品质、职业传统、职业特征

282、育婴员是通过对0~3岁婴幼儿的(D)的服务,辅助和指导家长完成科学育儿工作的人员。

- A、生活照料
- B、护理
- C、教育
- D、生活照料、护理和教育

283、育婴员的工作不仅要善于与孩子沟通,还要指导家长,将科学育儿的理念和方法用(D )的语言传递给家长,提高家长科学育儿的水平和能力。

- A、 专业
- B、 儿童化
- C、 简明扼要
- D、 通俗易懂

284、(C )是婴幼儿拥有一些新的能力的表现。

- A、 生长速度加快
- B、 旧特征消失的现象
- C、 好奇、好问及生理上出现恒齿等
- D、 好动

285、学习走路、学习食用固体食物、学习说话、学习控制排泄机能,是婴幼儿(B )。

- A、 学习的任务
- B、 生长发育的任务
- C、 养育的任务
- D、 游戏的任务

286、(B )阶段主要产生的是人类的低级思维形式,即感知动作思维,又称直觉行动思维。

- A、 0~1 岁
- B、 1~3 岁
- C、 2~3 岁
- D、 3~4 岁

287、婴儿(D)时能够比较稳定地注视某一物体,但持续的时间很短。

- A、 1~2 个月
- B、 2~3 个月
- C、 3~4 个月
- D、 5~6 个月

288、0~1 岁阶段主要建立的是(A )关系。

- A、 亲子
- B、 玩伴
- C、 朋友
- D、 群体

289、自我意识是意识的一个方面。包括自我感觉、自我评价、自我监督、自尊心、自信心、自制力、独立性等。它的发展是人的(B )的重要标志之一。

- A、 心理特征
- B、 个性特征
- C、 思想意识

D、 道德品质

290、在(A )阶段,开始产生一些不随意运动,进而有随意运动,即学会的运动。

A、 1~12 个月    B、 13~24 个月    C、 25~30 个月    D、 31~36 个月

291、婴幼儿气质特征是儿童个性发展的最原始的基础,其特点是( C )。

A、 不受先天影响  
B、 跟后天无关  
C、 具有先天的性质、受后天环境、教育条件的影响  
D、 受先天影响

292、婴幼儿脂肪过量会导致( D )。

A、 食欲减退  
B、 消化不良  
C、 发生酸中毒  
D、 以上都是

293、碳水化合物缺乏时,身体便动用(A )作为能(热)量来源。

A、 蛋白质和脂肪  
B、 无机盐和微量元素  
C、 碳水化合物  
D、 维生素

294、锌缺乏时会引起(D ) 。

A、 生长发育迟缓  
B、 食欲不振  
C、 免疫力下降  
D、 以上都是

295、水溶性维生素不包括(C )。

A、 维生素 B1、 B2、 B6、 B12    B、 维生素 C  
C、 维生素 A、 D、 E、 K    D、 叶酸、泛酸

296、婴幼儿对水的需要量取决于(D )。

A、 热量的需要  
B、 饮食的质量  
C、 与心脏、肾脏的浓缩功能有关  
D、 以上都是

297、儿童计划免疫有针对性地将( A)接种到人体中,提高易感者的特异免疫力。

- A、 生物制品
- B、 药物制品
- C、 细菌、病毒
- D、 细菌、病毒产生的毒素

298、卡介苗可以预防(D )传染病。

- A、 肺炎
- B、 乙型肝炎
- C、 甲型肝炎
- D、 结核病

299、婴幼儿使用的肥皂、浴液、爽身粉、婴幼儿油等应当( C)。

- A、 香味
- B、 刺激性
- C、 安全
- D、 药性

300、婴幼儿因长年为尿布包裹,易出现(C )。

- A、 湿疹
- B、 粟粒疹
- C、 尿布疹
- D、 荨麻疹

301、国家约定俗称的“三无”是指在包装上:( D)。

- A、 无生产厂家名称
- B、 无生产日期
- C、 无生产地址
- D、 以上都是

302、如果发现有人触电,应( D),使触电者马上脱离电源。

- A、 赶快切断电源
- B、 用干燥的木棍将电线挑开
- C、 用竹竿将电线挑开
- D、 以上都是

303、在意外紧急情况需要切断电源时,必须使用(A )剪断电线,不要用手硬拽电线。

- A、 电工钳
- B、 剪刀
- C、 切菜刀
- D、 以上都是

304、由于儿童发育还不完善,对有害物质的耐受性(B )。

- A、 较低
  - B、 特别低
  - C、 较高
  - D、 特别高
- 305、甜食、冷饮中维生素、矿物质含量低,会加剧营养(C )的状况,引起儿童虚胖。

- A、 过剩
- B、 不良
- C、 不平衡
- D、 缺乏

306、专家认为,目前(D )消费者普遍具有盲目性。

- A、 蒸馏水
- B、 纯净水
- C、 矿泉水
- D、 婴儿水

307、长期进食精细食物,不仅会因减少B族维生素的摄入而影响神经系统发育,还有可能因为(B)缺乏“株连”视力。

- A、 铅元素
- B、 铬元素
- C、 铝元素
- D、 铜元素

308、儿童如果饮用了过多的咖啡因则会出现(D )等症状。

- A、 头疼、头晕、烦躁
- B、 心律加快
- C、 呼吸急促
- D、 以上都是

309、补品中含有(B ),对儿童正常的生理代谢有影响。

- A、 激素和微量元素
- B、 激素和微量活性物质
- C、 优质蛋白和微量元素
- D、 优质蛋白和微量活性物质

310、儿童食物过敏者中大约(A )是由偏食造成的。

- A、 30%
- B、 40%
- C、 50%
- D、 60%

311、注意看食品包装标识是否齐全,注意食品外包装是否标明(D )。

- A、 厂名
- B、 厂址
- C、 生产日期
- D、 以上都是

312、被火围困时,应视不同情况,采取不同方法脱离险境,如( D)。

- A、 俯下身体
- B、 用湿布捂鼻
- C、 用湿衣物包裹身体
- D、 以上都是

313、在没有电话的情况下,应( D )或,协助灭火或报警。

- A、 大声呼喊
- B、 采取其他方法引起邻居、行人注意
- C、 迅速离开火场
- D、 以上都是

314、逃生时,尽量采取保护措施,如用(D )。

- A、 湿毛巾捂住口鼻
- B、 湿衣物包裹身体
- C、 弯腰低头迅速撤离
- D、 以上都是

315、取得劳动报酬\休息、休假,获得劳动、安全、卫生保护,接受职业培训技能是(A )的内容。

- A、 劳动权利
- B、 劳动义务
- C、 劳动争议
- D、 劳动就业

316、女职工的特殊保护一般是指女职工的(B )的保护。

- A、 婚姻
- B、 月经期、孕期、产期、哺乳期

- C、 财产
- D、 经济

317、工资是指基于劳动关系,用人单位根据劳动者提供的劳动数量和质量,按照(D )支付的货币报酬。

- A、 口头约定
- B、 双方协商
- C、 用人单位的标准
- D、 合同约定

318、用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定( C)。

- A、 时间
- B、 报酬
- C、 服务期
- D、 工种

319、用人单位依照《劳动法》有关规定应当向劳动者支付经济补偿的,在(C )支付。

- A、 工作交接前
- B、 工作交接时
- C、 办结工作交接时
- D、 工作交接一半时

320、为孕妇、产妇提供卫生、营养、心理等方面的咨询和指导以及产前定期检查等医疗保健服务,是(B )的内容。

- A、 母婴保健指导
- B、 孕妇、产妇保健
- C、 胎儿保健
- D、 新生儿保健

321、劳动权利是指有劳动能力的公民享有要求(B )和按劳取酬的权利。

- A、 参加劳动
- B、 劳动就业的机会
- C、 义务劳动
- D、 公益劳动

322、食品生产经营人员销售直接入口食品时,必须使用( D)。

- A、 手套
- B、 塑料袋
- C、 夹子
- D、 售货工具

323、《中华人民共和国教育法》第二条指出：“在中华人民共和国境内的各级各类教育,适用本法。”所以0~3岁早期教育也(D)。

- A、 不适用本法
- B、 参照本法
- C、 不参照本法
- D、 适用本法

324、母乳含有婴儿所需的(C)营养,有助于婴儿发育。

- A、 较多
- B、 较少
- C、 全部
- D、 部分

325、帮助母亲消除(C)情绪,建立母乳喂养的信心。

- A、 紧张、焦虑、讨厌、沮丧
- B、 紧张、讨厌、烦躁、沮丧
- C、 紧张、焦虑、烦躁、沮丧
- D、 紧张、焦虑、烦躁、讨厌

326、沸水消毒时加水至器具(C)水中,煮沸5~10分钟,其中煮奶嘴3分钟。

- A、 底部没入
- B、 部分没入
- C、 全部没入
- D、 以上都可以

327、生理性溢奶是由于(A),加上吃奶时易咽入空气,所以奶汁从胃中倒流入食道,从口中溢出。

- A、 胃的容量小,扩张力较低
- B、 胃的容量大,扩张力较低
- C、 胃的容量小,扩张力较高
- D、 胃的容量大,扩张力较高

328、婴幼儿发生溢奶时最主要的处理是(C)。

- A、 预防呛奶而导致新生儿肺炎和窒息
- B、 预防咳嗽而导致新生儿肺炎和窒息
- C、 预防呛奶而导致吸入性肺炎和窒息
- D、 预防咳嗽而导致吸入性肺炎和窒息

329、正常的营养在即使腹泻时也应维持。当然,这时可(A)添加新的辅食,保持原来的进食制度就可

以了。

- A、 暂缓
- B、 停止
- C、 继续
- D、 尽快

330、厌食、拒食可发生在改变居住地或替换养育者时,当然可能真的是有(B )疾病。

- A、 显性
- B、 隐性
- C、 消化道
- D、 呼吸道

331、婴幼儿空间概念的发展始于感知反应,最早的感觉是(C )。

- A、 听觉
- B、 视觉
- C、 触觉
- D、 嗅觉、等量

332、臀部清洗水的准备:先加冷水再加热水,将水温控制在(D )。

- A、 33~34℃
- B、 35~36℃
- C、 36~38℃
- D、 37~40℃

333、清洗阴茎时将包皮轻轻翻开,用(B )。

- A、 纸张沾水清洗龟头,注意动作要轻柔
- B、 纱布沾水清洗龟头,注意动作要轻柔
- C、 纸张沾水清洗龟头,注意动作要迅速
- D、 纱布沾水清洗龟头,注意动作要迅速

334、洗澡结束后的护理步骤:(D )。

- A、 擦干身上的水分
- B、 清洁外耳道、鼻腔的污垢与水珠
- C、 用 75%酒精清洁脐部
- D、 以上都是

335、应避免在眼睛四周(C )擦拭,以免造成增加婴儿眼睛细菌感染的机会。

- A、 左右
- B、 上下
- C、 重复
- D、 来回

336、初生婴儿鼻腔分泌物有:(D )。

- A、 羊水
- B、 胎脂
- C、 奶垢
- D、 以上都是

337、异常耳垢的形成原因有:(D )。

- A、 躺着喝奶
- B、 洗澡后未做适当的处置
- C、 长期未清理耳垢
- D、 以上都是

338、( B)婴儿要定时喂养,不仅有利于胃肠工作,还能够自然形成定时大便。

- A、 2~5 个月
- B、 3~6 个月
- C、 4~6 个月
- D、 5~6 个月

339、婴幼儿的皮肤细嫩,容易损伤,衣着不应选择( B)。

- A、 简单、宽松、质地柔软
- B、 以涤棉质衣料为主
- C、 吸湿性、吸水性和透气性良好
- D、 易穿脱且不影响四肢活动

340、面向前抱婴幼儿的目的是动作要领:(D )。

- A、 让婴幼儿背靠着腰部
- B、 用一只手抱住他的腰部
- C、 另一只手护住他的头部
- D、 使他能很好地看看面前的世界

341、为避免宝宝的不适,用背带兜抱婴幼儿应在哺乳后(B )分钟使用。

- A、 10
- B、 15
- C、 20
- D、 30

342、当婴幼儿能够独立( B)时,尽量不要使用婴儿车,以免摔出车外。

- A、 坐起
- B、 站起
- C、 爬行
- D、 行走

343、孩子上车后应立即使用安全座椅扣好安全带,并能够始终保持其(D )。

- A、 安静
- B、 安全
- C、 姿势
- D、 状态

344、清洁是在消毒灭菌之前,用物理方法清除污染物体表面的(D ),减少微生物的过程。

- A、 有机物
- B、 污迹
- C、 尘埃
- D、 以上都是

345、婴幼儿卧室应(B )。

- A、 每日常规清洁、消毒,隔天大搞卫生 1 次
- B、 每日常规清洁、消毒,每周大搞卫生 1 次
- C、 隔天常规清洁、消毒,每周大搞卫生 1 次
- D、 每周常规清洁、消毒,每月大搞卫生 1 次

346、使用蒸汽消毒的好处:( D)。

- A、 奶瓶上的图案能更有效地保存
- B、 令奶嘴更持久耐用
- C、 所有器具都可存放在消毒锅内
- D、 以上都是

347、棉质尿布用后应随换随洗,可选用(B )洗,用清水漂洗干净,再放在阳光下晒干。

- A、 碱性肥皂
- B、 中性肥皂
- C、 药性肥皂
- D、 洗衣粉

348、通过水的刺激,可( D)。

- A、 增强机体体温调节机能反应能力
- B、 促进血液循环好坏
- C、 增强机体对外界气温变化的适应能力
- D、 以上都是

349、日光浴夏天适宜在上午 8~9 点,下午 15~17 点进行,冬天可在(B )进行。

- A、 早上
- B、 中午

- C、 傍晚
- D、 晚上

350、日光浴时要注意观察婴儿的反应,如(D ),以判断婴儿可接受日光照射的时间和强度。

- A、 脉搏
- B、 呼吸
- C、 皮肤发红及出汗情况
- D、 以上都是

351、抚触的时候可以同时给宝宝( D)还要注意与宝宝眼神的沟通。

- A、 播放一些音乐
- B、 唱儿歌
- C、 讲故事
- D、 以上都是

352、看病时要向医生说明婴幼儿就诊的原因,包括(D )。

- A、 主要症状
- B、 发病时间
- C、 自行的处理及用药情况
- D、 以上都是

353、擦伤的伤口不适宜用创可贴,普通创可贴(D ),容易引起伤口发炎,甚至导致溃疡。

- A、 吸水性和透气性不好
- B、 不利于创面分泌物及脓液的引流
- C、 有助于细菌的生长繁殖
- D、 以上都是

354、外伤(B )后如局部仍有红肿、疼痛,可改用热敷,以扩张血管,促进血液循环,促进康复。

- A、 12 小时
- B、 24 小时
- C、 36 小时
- D、 48 小时

355、粗大动作训练可以促进大脑发育的(C ),使人脑各有关部位的神经联系更加丰富,更加精确。

- A、 主动性
- B、 积极性
- C、 协调性
- D、 能动性

356、(D )为基本运动技能时期,以技能运动为主,包括跑(追逐跑、障碍跑)、跳(原地向上跳、向前跳)、投掷(投远、投向目标)、单脚站立、翻滚、走平衡木、抛物接物、玩运动器械(坐滑梯、荡秋千、蹬童车)等。

- A、 0~6 个月
- B、 7~12 个月
- C、 13~18 个月
- D、 19~36 个月

357、婴幼儿粗大动作练习一次的训练时间不宜太长,由于个体存在差异,以婴幼儿( B )为宜。

- A、 开心
- B、 不感觉疲劳
- C、 兴趣
- D、 疲劳

358、经常促进训练婴幼儿的手指动作活动,可以加速( A )的发育。

- A、 大脑
- B、 动作
- C、 手眼协调
- D、 感知觉

359、( C )是套圈、垒高、食指按压、敲打、舀的动作发展时期。

- A、 0~6 个月
- B、 7~12 个月
- C、 13~18 个月
- D、 19~24 个月

360、0~3 岁是学习语言的最佳时期,大脑皮层的( D )特别敏感,容易对听到的语音进行记录和整理。

- A、 视觉区
- B、 听觉区
- C、 运动区
- D、 语言区

361、进行婴幼儿指认游戏的顺序是( B )。

- A、 卡片、书上的人物和物体-家庭里的人物和物体-小区周围的人物和物体-马路街道上的人物和物体
- B、 家庭里的人物和物体-卡片、书上的人物和物体-小区周围的人物和物体-马路街道上的人物和物体
- C、 家庭里的人物和物体-小区周围的人物和物体-卡片、书上的人物和物体-马路街道上的人物和物体
- D、 小区周围的人物和物体-卡片、书上的人物和物体-家庭里的人物和物体-马路街道上的人物和物体

362、婴幼儿的认知能力的形成是( C )发育成熟的结果。

- A、 身体
- B、 感觉器官
- C、 大脑
- D、 手眼协调

363、( A )的婴儿,还不会使用语言,以感觉、知觉和动作来适应环境,以行动来“指挥”或“控制”周围的环境。

A、0~12个月 B、13~19个月 C、20~24个月 D、25~36个月

**判断题（364-766）：**

364、（×）职业道德是指从事一定职业的人，在家庭或公共场所中，应该遵循的与其职业活动紧密联系的道德规范的总和。

365、（√）育婴工作既不同于家庭保姆，也有别于托幼机构中的保育员。

366、（√）每个婴幼儿都是一个独立的个体，相同的个体在不同阶段的特点不同，所采用的教育方法不同。

367、（√）学习与人际交往和控制情绪是婴幼儿生长发育的任务。

368、（√）一个人没有玩伴或朋友，就不会有健康的心理。

369、（√）在婴幼儿营养方面至关重要的元素有钙、磷、镁、钠、钾、氯、锌、铁、铜、碘、硒。

370、（√）脊灰疫苗是预防小儿麻痹症的。

371、（√）育婴员应知道电源总开关的作用与位置，学会在紧急情况下关断总电源。

372、（√）夫妻书面约定婚姻关系存续期间所得的财产归各自所有，女方因抚育子女、照料老人、协助男方工作等承担较多义务的，有权在离婚时要求男方予以补偿。

373、（×）水果与蔬菜所含营养成分不尽相同，但两者可以相互代替。

374、（×）从第3个月起，即可添加辅助食物。

- 375、(√)到1岁左右要教孩子自己吃饭,开始会很糟,也许吃到嘴里比弄到桌上的多。但也要尊重孩子自己吃饭的热情。
- 376、(×)培养婴幼儿有规律地大小便,可以在大脑建立起一系列的条件反射,提高机体的工作效率,以保证消化系统的功能完善。
- 377、(×)育婴员要对碗筷进行清洁消毒,可将碗筷垒叠用消毒柜消毒。
- 378、(×)新生儿出生时体重约为3kg,生后3-5天可出现生理性体重下降。
- 379、(×)大脑发育不全常见于脑积水。
- 380、(×)体重的测量以斤为单位,准确记录至小数点后2位。
- 381、(√)测量头围前要检查软尺刻度是否正确,测量数人后应检查刻度,防止因反复牵拉而影响正确性。
- 382、(×)3岁以下儿童测量坐高时大、小腿间应呈60°角。
- 383、(√)均值离差法,即以各项体格生长发育指标的均值为基准值,以标准差为离散距的评价方法。
- 384、(√)患鹅口疮可用2~3%碳酸氢钠(小苏打)溶液清洁口腔。
- 385、(√)乘坐公共汽车时,不要向车窗外乱扔杂物,以免伤及他人。
- 386、(√)婴幼儿做主被动操,可以帮助婴幼儿学会与人交流及与社会合作的技巧。
- 387、(×)婴幼儿被动操屈伸运动预备姿势:婴儿仰卧,操作者握住婴儿两手腕,使婴儿两腿伸直,放松。

- 388、(√)婴幼儿横托抱动作练习:右手抓住婴儿的右手腕上提,左手托在婴幼儿的颈背部,再用右手托住婴儿的臀部,托至胸前后两手距离逐渐加大。
- 389、(×)婴幼儿横托抱动作练习,会增加腹部压力,造成腹泻。
- 390、(×)婴幼儿横托抱动作练习,做操时两手距离窄些,会更安全。
- 391、(×)在进行婴幼儿的主被动操起坐运动时,成人双手紧握住婴儿手腕,用力拉起。
- 392、(√)在进行婴幼儿的主被动操提腿运动时,将两腿向上抬起,做推车状,随月龄增大,可让婴儿两手支撑抬起头部。
- 393、(√)如果婴幼儿只对玩具或物品感兴趣,要排除自闭症。
- 394、(×)在进行婴幼儿的主被动操扶走运动时,扶婴儿手指学走,重复两个8拍。
- 395、(×)为1岁以前的婴幼儿选择发展听说能力的图书,在主要情节图的基础上,可以适当添加简单的背景,便于婴幼儿理解人物与背景的关系和变化。
- 396、(×)要尽量让婴幼儿学习不能理解的语言,如三字经、古诗等。
- 397、(√)与婴幼儿进行节律游戏时重在培养婴幼儿的兴趣和节奏感,不要过分追求技能。
- 398、(√)经常鼓励宝宝,宝宝的表现欲望会逐日增加,这样可以把宝宝自发的行为转换为与成人的交流行为。
- 399、(√)宝宝涂鸦时,成人要及时夸奖,鼓励大胆作画很重要。
- 400、(√)婴儿的情绪表达有面部肌肉运动模式、声调和身体姿态3种形式。

401、(√)成人过多的阻止会限制婴幼儿合理的探索和创造性的发展,形成胆小内向的性格;过多的鼓励会引起婴幼儿危险的举动和任性。

402、(√)培养婴幼儿的沟通能力,还要指导婴幼儿使用正确的语言向他人问好、说再见等,提示婴幼儿用语言正确表达自己要喝水、要玩具等个人需求。

403、(×)给婴幼儿创造宽松的环境,就是可以让他为所欲为。

404、(√)职业道德原则和规范是在职业活动实践中总结和概括出来的,考虑到本行业人员的接受能力。

405、(×)戴上一个“听诊器”,装扮成大夫给“病人”看病;拿上一件小衣服,装扮成“妈妈”给“孩子”穿衣服等。这是1岁左右孩子经常做的事。

406、(×)儿童如果常年饮用矿泉水,将有利于身体健康。

407、(√)未成年人享有隐私权,任何组织和个人不得披露未成年人的个人隐私。

408、(×)胡萝卜中含丰富的维生素E,可促进上皮组织生长,增强视网膜的感光力,是婴儿必不可少的营养素。

409、(√)提供食品不要以孩子是否喜欢吃为标准。

410、(√)睡眠是大脑皮层的生理性保护性抑制,是恢复人体精神和体力的必要条件。

411、(×)应让婴幼儿多练习自己吃饭,不配合可随意中止。

412、(×)筷子的使用较为困难,属于社会性行为,最好等婴幼儿2岁以后再尝试练习。

- 413、(√)3岁以内婴幼儿因立位测量不易准确,而采用卧位测量,故称身长。
- 414、(×)3岁以下小儿测身长时读刻度,记录至0.5cm。
- 415、(×)胸围的测量时男童及未开始青春发育的女童软尺应经过乳头下缘。
- 416、(×)婴幼儿的皮肤十分娇嫩,由于真皮层发育不完善,受外界侵袭易出现感染,因而应倍加呵护。
- 417、(×)酒精擦浴,全部擦浴时间在20分钟左右。
- 418、(×)常用开塞露、肥皂头通便,可以纠正习惯性便秘。
- 419、(×)鹅口疮如果不治疗,病变可以向下蔓延到气管及整个肺部,发生全身性白色念珠菌感染。
- 420、(×)脐带脱落之前,可以让宝宝泡在浴盆里洗澡。
- 421、(×)湿疹如果护理不当,极有可能使患处皮肤感染化脓,引起败血症。
- 422、(√)在有火的地方安放防护栏。
- 423、(×)训练婴幼儿写字画画应用铅笔,以防戳伤。
- 424、(×)玩爬网活动,要求幼儿攀爬时要双手抓牢,可推别人。
- 425、(√)如果婴幼儿失去知觉时,只进行口对口呼吸无效,要立即实施胸外心脏按压。

426、(√)伤口的正确处理是防止感染的第一步,越早越好。

427、(×)婴幼儿横托抱动作训练,婴儿身体受重力作用背部开始下垂,当身体下降到弯曲程度出现本能的挺胸动作后,双手向一起靠拢。

428、(√)在进行婴幼儿的主被动操起坐运动时,成人双手握住婴儿手腕,拇指放在婴儿掌心里,让婴儿握拳。

429、(×)为婴幼儿选择发展听说能力的图片,一盒的图片里最好有几类的物品。

430、(√)婴幼儿语言的获得是在跟人面对面的交往中学会的,有声读物是单向输入,婴幼儿由此失去交流回应的机会。

431、(√)与宝宝的“对话”应当是宝宝当下情景中的内容:把说话融入日常生活,边做边说,把自己正为婴幼儿做的事情说出来。还可以结合婴幼儿生活中经常接触的事物作为说话的内容。

432、(√)婴幼儿在认知游戏活动中,主要通过动作与玩具、实物接触,在操作摆弄中认识和了解物体的性能和特点。

433、(×)让宝宝长时间听播放的音乐,可以培养宝宝成为音乐天才。

434、(√)随着婴幼儿的成长,情绪日益在社会意义上支配、控制与调节着婴幼儿的行为。

435、(√)有时婴幼儿会故意做一些恶作剧,以观察成人的反应。如不让打开电冰箱,他就故意把冰箱打开。这时最好的办法是故意装作看不见,让他觉得没趣而停止“恶作剧”。

436、(√)每个从业人员都必须牢固树立主人翁责任意识,增强社会责任感。

437、(√)职业道德规范是从业人员必须遵循的守则,不得违反,如有违反,必须受到纪律处分和经济制裁。

- 438、(√)育婴员是直接为婴幼儿、为家长、为社会提供服务的一种“窗口行业”。
- 439、(×)婴幼儿语言词汇、记忆力、认知、推理和社会交往的能力不断提高是生理方面的变化。
- 440、(×)1岁左右的婴儿可以有意识地回忆以前的事件。
- 441、(√)婴幼儿所必需的营养素包括蛋白质、碳水化合物、脂肪、无机盐、维生素、膳食纤维、水等。
- 442、(√)房间内起火时,不能轻易打开门窗,以免空气对流,形成大面积火灾。
- 443、(√)用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。
- 444、(√)对有关婚配、生育保健等问题提供医学意见是婚前卫生咨询的内容。
- 445、(√)胡萝卜中含丰富的维生素A,可促进上皮组织生长,增强视网膜的感光力,是婴儿必不可少的营养素。
- 446、(√)提供食品要符合孩子的年龄和消化功能。
- 447、(×)人在觉醒状态下时,生长激素分泌升高;睡眠时,生长激素分泌明显减少。
- 448、(√)睡前将婴儿的脸、脚和臀部洗净或睡前可给婴幼儿洗澡、按摩,都有助于婴幼儿更好入睡。
- 449、(×)训练婴幼儿控制大小便,要顺应个体发展,不能强求。
- 450、(√)每个婴幼儿的生理成熟程度不同,大小便控制有明显的差异,培养时要因人而异。

- 451、(×)身高受营养的长期影响不显著,但与短期营养状况关系密切。
- 452、(√)新生儿出生时胸围小于头围  $1\sim 2\text{cm}$ ,一般在1岁后胸围赶上头围。
- 453、(×)为预防感染需要我们细心的护理,一旦发现新生儿脐炎应立即自行处理。
- 454、(×)识别脱水要点:嘴唇、口部及皮肤干燥,脸色苍白,尿多。
- 455、(×)浓度95%的酒精才具有消毒效果,75%的酒精只有干燥作用。
- 456、(√)楼梯上的地毯要固定好,防止滑动。
- 457、(√)在帮助宝宝做操时,大人要始终保持关注的心情与婴幼儿进行肢体和语言的交流。
- 458、(×)在进行婴幼儿的主被动操扶走运动时,牵婴儿手指学走,重复两个8拍。
- 459、(√)为  $1\sim 2$  岁婴幼儿选择发展听说能力的图书在主要人物的基础上,可以添加一些小的辅助图,便于培养婴幼儿对细微图的兴趣和观察能力。
- 460、(√)要用儿语的声调与婴幼儿交谈,儿语的特点是发音清晰、吐字缓慢;运用高频语音,带有感情;句子短而重复多;一旦有所应答,应给予强化,形成互相的交流。
- 461、(√)给宝宝做操时可以播放活泼欢快的音乐。
- 462、(√)不论宝宝模仿涂鸦的作品水平如何,成人都应用极大的热情鼓励和表扬。
- 463、(√)当婴幼儿愿意表演儿歌、唱歌、搭积木、拼图等,成人每次要给予称赞,鼓舞信心。

464、(×)为了培养玩伴关系,不论婴幼儿是否愿意,都应该强制分享食物或玩具。

465、(×)职业道德是指从事一定职业的人,在家庭或公共场所中,应该遵循的与其职业活动紧密联系的道德规范的总和。

466、(√)多和宝宝说话,培养愉快情绪,按照宝宝成长需要及时提供学习机会和条件。

467、(×)气质既是稳定的,又是可变的,但在出生后的最初一段时间表现得不明显。

468、(×)儿童计划免疫是有针对性地将生物制品接种到人体中,提高患病者的特异免疫力。

469、(√)水果与蔬菜所含营养成分不尽相同,两者不能相互代替。

470、(√)从第4-6个月起,即可添加辅助食物。

471、(×)婴幼儿进餐时可以看电视。

472、(×)进食的环境不太嘈杂,以免影响进食情绪;进食的位置不用固定,但不可边走路边进食。

473、(√)让婴幼儿与家人一起共餐,通过模仿来学习吃饭。

474、(×)头胸围交叉时间与婴幼儿的营养状况有关,大约在18个月左右。

475、(×)婴幼儿坐高占身高比例大于正常时,应考虑遗传性疾病。。

476、(√)体重的测量以公斤为单位,准确记录至小数点后2位。

- 477、(×)测量头围前要检查软尺刻度是否正确,测量一百人后应检查刻度,防止因反复牵拉而影响正确性。
- 478、(×)前囟门大小即两对边距离乘积,以厘米为单位,精确至0.5cm。
- 479、(×)体温的高低与许多的因素有关,如哭闹、进食活动、室温过低、衣着过少等都会使体温升高。
- 480、(√)母乳喂养儿,含接姿势不正确,吸入过多空气均会引起婴幼儿呕吐。
- 481、(√)教会婴幼儿养成饭前便后洗手的习惯,不喝生水,不吃不洁食物。
- 482、(×)患鹅口疮可用高锰酸钾溶液清洁口腔。
- 483、(√)患鹅口疮应将婴儿的食具如奶瓶、奶嘴、小勺、口杯等进行消毒处理。
- 484、(√)尿布疹预防措施:换下尿布后不必马上包上尿布,可让小屁股通风一会,使其保持干燥。
- 485、(√)保证婴幼儿接触不到有电线的设备。
- 486、(×)给婴幼儿放洗澡水时,要先放热水,后放冷水。
- 487、(√)带婴幼儿乘坐出租车时,不要向车窗外乱扔杂物,以免伤及他人。
- 488、(√)为婴幼儿选择发展听说能力的图片,一盒的图片里最好放同一类的物品。
- 489、(×)与婴幼儿进行节律游戏时一定要准确跟随节奏,不能出错。

- 490、(×)无序杂乱的刺激能建立大脑神经的联系,学习能力就因此培养起来。
- 491、(√)即使让宝宝长时间听播放的音乐,也不一定能培养宝宝成为音乐天才。
- 492、(√)组织婴幼儿进行艺术表现采用模仿表现法时,不追求模仿的结果,只注重模仿的过程。
- 493、(×)宝宝涂鸦时,如果画的不像,成人要及时指并让宝宝改正。
- 494、(×)成人制定一个命题,如画太阳,成人先示范,让宝宝模仿。这是自由涂鸦法。
- 495、(×)因为孩子小,可以把成人的不满情绪发泄在婴幼儿身上。
- 496、(√)婴幼儿出现认生、害羞后要减少与生人相处,减少焦虑情绪。
- 497、(×)为了让婴幼儿克服害羞,让陌生人抱一抱,时间越久越好,哭了也要坚持。
- 498、(×)经常和婴幼儿进行眼对眼的接触,最佳距离为80cm。
- 499、(√)高质量的产品和服务是提高行业信誉度的有力保障。
- 500、(×)育婴工作就等于家庭保姆或托幼机构中的保育员。
- 501、(√)婴幼儿在每一阶段,各种心理发展变化的过程或速度也会有个体差异,但差异是在量的水平上,而不是在质的水平上。
- 502、(×)蛋白质、脂肪和碳水化合物三者的供给,自由配比就能发挥各自的良好作用。

- 503、(√)在失火的楼房内,逃生不可使用电梯,应通过防火通道走楼梯脱险。
- 504、(√)提供给孩子的膳食要均衡和多样化。
- 505、(×)培养婴幼儿有规律地大小便,可以通过强迫的方法。
- 506、(×)餐中可以给婴儿换尿布,提醒幼儿去小便。
- 507、(×)三岁以后就可以学用筷子吃饭。
- 508、(√)养成每天早晨起床后,或者午睡起床后,或者临睡前排便的习惯。
- 509、(×)每天坚持让婴幼儿练习坐便盆,就可以逐渐形成习惯。
- 510、(√)体重是衡量体格生长的重要指标,也是反映婴幼儿营养状况最容易获得的灵敏指标。
- 511、(√)前囟门大小即两对边距离乘积,以厘米为单位,精确至0.1cm。
- 512、(√)便秘是指大肠内积存过多或过久的废物,或大便太干和硬。
- 513、(√)婴幼儿进餐时不能边吃边看手机。
- 514、(√)黄疸较深,严重时可引起“核黄疸”,即胆红素脑病,则其预后差,除可造成神经系统损害外,严重的可引起死亡。
- 515、(×)由霉菌和细菌引起的尿布疹需要给予合适的含有抗生素或激素的药膏。
- 516、(×)在湿疹发作时,可以预防接种,不会发生不良反应。

517、(×)为了让婴幼儿多吃点,可以让他边看书边吃。

518、(√)不要把电熨斗打开后离开,婴幼儿可能会把熨斗和熨衣架弄翻。

519、(√)不要让婴幼儿拿到塑料袋。

520、(√)在没有交通民警指挥的路段,要学会避让机动车辆,不与机动车辆争道抢行。

521、(×)婴幼儿被动操屈伸运动注意事项:屈伸动作要快而有节奏。

522、(√)婴幼儿横托抱动作训练,做操时两手距离宽些,会更安全。

523、(×)在进行婴幼儿的主被动操起坐运动时,成人只要捏住住婴儿手指,迅速用力拉起。

524、(×)在进行婴幼儿的主被动操提腿运动时,将两腿向上抬起,抬得越高越有训练效果。

525、(×)在进行婴幼儿的被动操翻身运动时,让婴儿翻得越快越好。

526、(×)在进行婴幼儿的俯卧抬头训练时,坚持时间越长越好。

527、(×)婴幼儿的语言能力,可以从看动画片里得到很好的训练。

528、(√)用成人对待客人的热情态度和友好气氛去感染婴幼儿,帮助他克服怯生情绪,学会逐渐适应生人和熟悉环境。

529、(√)婴幼儿出现认生、害羞也要适当与生人接触,不能一味避开。

530、(√)职业道德规范对从业人员的劳动态度、职业责任、服务标准、操作规范、职业纪律等方面都有明确的规定,如有违反,要受到行业纪律处分。

531、(×)育婴员就是幼儿园的保育员。

532、(√)不要用湿手去摸灯口、开关和插座。

533、(×)每次清洗后暴露婴儿的臀部于空气或阳光下,或用紫外线灯照射使局部皮肤干燥。

534、(×)气质是一成不变的。

535、(×)食品出锅后应立即吃掉,夏秋季节在室温下存放不应超过6小时。

536、(√)从事母婴保健工作的人员,应当严格遵守职业道德,为当事人保守秘密。

537、(×)如果鼻腔内有残留物,应及时用纸张清理干净。

538、(×)遇到孩子大便不正常时或次数稍增多时应马上就忌嘴。

539、(×)采用少量多餐的方法,每日随机添加辅食。

540、(√)臀部清洗前准备好新的尿不湿和换洗用的衣物。

541、(×)由上往下清洗“小鸡鸡”。清洗反面时,妈妈可用手指轻轻按下“小鸡鸡”,但不可用力拉扯。

542、(√)清理眼屎应从眼内侧向眼外侧轻轻擦拭。

- 543、(√)清理初生婴儿鼻腔分泌物,使用的棉花棒,必须是在药房或婴幼儿用品店消毒过的棉花棒。
- 544、(×)有些情况下,耳屎可能坚硬如石头。这就需要自行及时处理,以清除耳屎,避免常伴有大量坚硬耳屎的慢性感染。
- 545、(×)随着年龄的增长,婴幼儿的大脑皮层逐步发育,睡眠的时间可逐步延长。
- 546、(×)7~12个月婴儿全天睡眠时间合计应达12~13小时。
- 547、(×)婴幼儿睡眠不足的表现:体重、身高能够按正常的生长速率增长。
- 548、(×)生长激素能够减缓机体本身的骨骼、肌肉、结缔组织及内脏等的增长。
- 549、(√)10~12个月婴幼儿在成人提醒下知道是否有大小便,坐盆时要求婴幼儿不摸地、不脱鞋,集中精力便完以后再玩。
- 550、(×)不管何种抱姿,都要注意保护好婴幼儿,不仅要抱得舒服,还要让宝宝有平衡感。
- 551、(×)前抱式用背带兜抱婴幼儿的方式适合6~30个月,带宝宝认识美好世界。
- 552、(√)给婴幼儿创造一个健康、快乐的环境,是对居室环境的基本要求。
- 553、(√)水蒸气能有效杀死病菌,无需加入任何化学品。奶瓶、奶嘴上不会残留化学品,不会影响婴幼儿健康。
- 554、(√)空气浴可与各种活动如主被动操、游戏、体操、走路结合进行。
- 555、(√)在婴儿进行日光浴以前,要先开门、窗,让宝宝有个适应的过程再出门。

556、( ×)游泳圈用洗洁精擦拭,再用清水冲洗、晾干。

557、( √)抚触胸部:两手分别从胸部的两侧肋下缘向对侧肩部按摩,应避免乳头。

558、( ×)发热是婴幼儿生病时最迟出现的征象。

559、( ×)肝脏排泄功能不成熟,特别是新生儿,对药物及其分解产物滞留体内的时间延长,增加药物的不良反应。

560、( √)擦伤的伤口不适宜用创可贴,应该消毒后让伤口自然暴露在空气中,以待愈合。

561、( √)热敷会使破裂的毛细血管进一步扩张,加重血肿,延迟愈合。

562、( √)缓解蜇伤部位的肿胀和瘙痒等症状,注意不要用花露水,因其非但没有消炎作用,还会刺激伤口。

563、( √)选择的训练项目要适合婴幼儿的年龄特点。

564、( √)婴幼儿精细动作练习结束时要及时洗手。

565、( ×)概念的建立、掌握词汇的多少,不是测量婴幼儿语言发展的重要标志。

566、( √)婴幼儿不会说话时,可以跟着大人背诵的节奏做动作,过一段时间就可以随着大人说出最后押韵的字,以后就可以逐渐说出一句儿歌,最后可以说出完整的儿歌。

567、( √)成人可以跟随婴幼儿探索的兴趣,创设丰富的环境,启发婴幼儿自主学习。

568、(×)婴幼儿认知能力训练,对同一类玩具可以提供不同形式和难度的样品。

569、(√)戴上一个“听诊器”,装扮成大夫给“病人”看病;拿上一件小衣服,装扮成“妈妈”给“孩子”穿衣服等。这是3岁左右孩子经常做的事。

570、(×)衣服和常用物品用国家有关部门检验合格的洗涤用品,用清水漂洗一遍即可。

571、(×)更换灯泡时,不用关闭开关,站在干燥绝缘物上进行即可。

572、(√)社会保险是指劳动者在年老、伤病、残废、生育、死亡造成劳动能力丧失或失去职业岗位等客观情况下,发生经济困难而从国家和社会获得补偿和物质帮助的一种社会保障制度。

573、(×)一般按摩、抚触、洗澡、喂药等都应放在喂奶后。

574、(×)挑食,偏食是由于喂食太频繁零乱,辅食添加过快,喂养的气氛不愉快、太强迫等原因造成的。

575、(√)每次清洗后暴露婴儿的臀部于空气或阳光下,或用红外线灯照射使局部皮肤干燥。

576、(√)清洗男童睾丸时用手轻轻将婴儿的睾丸托起再清洗。

577、(×)用棉棒蘸95%酒精清洁脐部。

578、(×)从小进行常规性训练,可养成婴幼儿有规律的生活和活动习惯,能够培养自律能力和自我生活能力,帮助婴幼儿建立自律能力。

579、(×)1岁以后的婴幼儿可在成人的指导下,学会主动坐盆。夜里定时把尿,把尿时要让婴幼儿处于清醒状态,逐步培养其有尿自己会醒的习惯。

580、(√)每次喂奶后因为进食引起胃肠反射容易发生粪便排泄,要及时换尿布。

581、(√)可选择宽松的裤子,如使用松紧带千万不要勒得太紧,否则会影响到宝宝的呼吸和骨骼的正常发育。

582、(×)最好给宝宝戴舒适透气的软布做成的有毛边的帽子。

583、(×)因为婴幼儿体质不比大人,除菌消毒时,多用化学品才能尽可能避免留下“祸患”。

584、(×)水浴是利用水的温差和水的机械作用来锻炼身体。锻炼可从冷水逐渐过渡到温水。

585、(×)抚触时孩子哭闹、呕吐时可继续操作。

586、(√)婴幼儿活动量大,代谢增加运动和进食的时候都会使体温升高。

587、(×)叙述病情时一定要详细,必要时可夸大病情。

588、(×)左手的食指和拇指将上下眼睑分开,另一手轻挤药瓶将药水滴入眼睛,让药液滴落到眼球上。

589、(×)如血肿发生在头部,且颅骨正常,血肿没有持续增大,精神如常,出现呕吐,可以先观察,必要时送医院就诊。

590、(×)以行走平衡感发展为主,包括站立、独立走(向不同方向走、直线走、曲线走、侧身走、倒退走)、攀登、掌握平衡等,是19~36个月婴幼儿大动作发展的特点。

591、(√)粗大动作训练时要关注婴幼儿的情绪和表情,大人随时用表情和语言跟婴幼儿沟通。

592、(√)7~12个月可以提供能发出声音的玩具(小鼓、琴等)让宝宝拍打;提供小玩具和容器让宝宝取物和投放;提供不同规格和质地的小球让宝宝抓捏和扔球。

593、(×)进行精细动作训练,只要提供玩具让婴幼儿自行玩耍就行了。

594、(×)婴幼儿是受电视中快速变化的声音和图像的吸引,对他们的语言发展有提高作用。

595、(√)婴幼儿双手精细动作是智慧发展的基础,通过看一看、摸一摸、闻一闻、咬一咬、敲一敲、动一动等方式来认识和了解事物。

596、(√)每一个正常的婴幼儿都具有惊人的学习能力。

597、(×)通过抓、握、嚼等这样的动作来了解世界和事物,不是婴儿最常用的认知方式。

598、(√)婴儿出生后3~6周出现社会性微笑,高频语声和人的面孔刺激是诱因。

599、(√)婴儿阶段生长非常迅速,相对于成人需要更多的营养素。

600、(√)适量摄入维生素对于婴幼儿成长很有帮助,过多摄入对机体无益。

601、(×)食品安全指食品对人体健康造成任何急性、亚急性或者慢性危害。

602、(×)若常饮易拉罐饮料,必然造成铅摄入过多。

603、(×)婴儿4个月后可先添加米糊,以促进淀粉酶分泌并可补充维生素C。

604、(×)婴儿生病时和注射疫苗时可以洗澡,因为洗澡可以清除污垢,增强抵抗力。

605、(×)为婴儿修指甲应选择婴儿清醒时进行。

- 606、(×)宝宝出牙时不可以给婴幼儿提供出牙嚼环或橡皮奶嘴让他咀嚼。
- 607、(×)有时婴幼儿喜欢吸吮手指要予以干预,这对稳定婴幼儿自身情绪也起到了一定的作用。
- 608、(×)使用专为婴幼儿设计的比较安全的便盆,并将便盆放在离游戏较近的位置。
- 609、(√)裹得严严实实的并不是保暖的最佳方式,过度的保温会使婴幼儿体温升高,严重时可造成“包裹热”。
- 610、(×)自从新生儿出生以后,尤其被人抱起时头和颈得不到平衡,有向下坠落感觉,会出现惊吓。
- 611、(√)新生儿的小腿稍向外弯曲,是子宫内的环境造成的,属于正常的生理现象,随着生长发育会自然变直。
- 612、(√)婴幼儿出行小帽子也是必备的,既能挡风又能挡住过于强烈的太阳光。
- 613、(×)清洁可消除物品表面的病原微生物。
- 614、(×)经常使用强效的消毒剂对日常生活环境消毒,能预防疾病,保障健康。
- 615、(√)煮沸消毒后的物品在取出和存放时要防止再污染。
- 616、(×)孩子很容易通过抚摸玩具而受到细菌的感染,从而影响健康,因此家长应该每天对孩子的玩具消毒。
- 617、(×)抚触腹部:两手依次从宝宝的右下腹至上腹向左下腹,呈逆时针方向按摩。
- 618、(√)婴幼儿的精神状态是反映病情轻重的重要指标。

619、(√)放置时间过久的药和已过期失效的药不能服用。

620、(√)生病期间应多喂水是非常必要的。

621、(√)皮下血肿不能用手揉,越揉血肿越大,出血越多,疼痛越强烈。

622、(√)婴幼儿语言词汇、记忆力、认知、推理和社会交往的能力不断提高是心理方面的变化。

623、(×)发烧期间多喂奶或果汁是非常必要的。

624、(√)1岁以后,随着年龄的增长,活动范围的扩大,认识事物的增多,会记住越来越多的东西。

625、(√)具体形象思维是一种依靠事物或情景的表象及表象的联想进行的思维活动。

626、(×)在整个0~3岁阶段,有意注意占有主导地位,无意注意还处于萌芽状态。

627、(√)自我意识的发展是人的个性特征的重要标志之一。

628、(√)当婴幼儿开始能在自己的言语调节下有意地行动或抑制某种行动的时候,这就出现了意志的最初形态。

629、(√)由于有了言语,人不但能直接感知具体的事物,形成感觉、知觉和表象,而且还能间接认识事物的本质和规律,形成抽象逻辑思维。

630、(×)人体所必需的营养素有6种。

631、(×)接受+控制的权威型教养方式,这种教养方式下的儿童缺乏责任感,合作性差,很少为别人考虑,自信心不足。

- 632、(√)父母按照自己的理解或者盲目照搬别人的教子经验,尽管也在家庭教育上花了很多时间,收效却并不理想。
- 633、(√)婴幼儿心理发展是整个儿童心理发展的早期阶段,其发展的好坏对以后的发展有重要作用。
- 634、(×)感觉是反映当前客观事物的整体特性的认知过程。
- 635、(√)为不让孩子输在起跑线上,家长便想方设法在家里苦教孩子本领,通过机械技艺区完成许多的“提前作业”,这是违背教育规律的做法。
- 636、(×)家用电器在超过家庭电源插座、保险丝、电表和导线的允许负荷的情况下,方可使用。
- 637、(√)饮用矿泉水应有针对性,缺什么补什么最好。
- 638、(√)不许在电杆和拉线附近挖坑、取土,以防倒杆断线。
- 639、(√)教育婴幼儿注意安全,讲清乱动电器的危害,在没有成人的情况下,不乱摆弄电器设备。
- 640、(×)食品安全指食品无毒、无害,符合一般的营养要求。
- 641、(×)专制型父母与孩子,他们之间的沟通是没有障碍的。
- 642、(√)“棍棒”和“溺爱”是现代家庭教育理念的两个极端。
- 643、(×)婴幼儿3岁左右,在活动过程中,通过自我感觉逐步认识作为生物实体的自我。
- 644、(×)婴幼儿的意志力水平较好,可以长时间控制自己的行为。

645、(√)甜味是人出生后本能喜爱的味道,其他味觉是后天形成的。

646、(√)易拉罐是以铝合金为材料制成的,为避免铝合金与饮料接触,其内层涂以有机涂料以做隔离。

647、(×)儿童如果常年饮用纯净水,将有利于身体健康。

648、(√)家用电器使用完毕,要随时切断电源。

649、(×)对于孩子来说,肝脏的解毒功能、排毒功能是从弱到强的过程。

650、(√)亲手为宝宝制作食品,安全性较有保障,而且价格便宜,经济又实惠。

651、(√)婴幼儿的消化能力和对食物的适应能力尚未成熟,不能接受和大人完全一样的饮食。

652、(√)不管是碳酸饮料、营养保健型饮料,还是当前许多家庭热衷的纯净水和矿泉水,都不宜代替自来水作为人的主要饮用水。

653、(√)从饮食结构分析膨化食品有其一定的缺陷,只能偶尔食之。

654、(√)拒绝+容许的忽视型教养方式下的儿童在青少年时期更有可能出现不良行为问题。

655、(×)破裂的单亲家庭对子女身心发育不会产生影响。

656、(√)当前许多家长有一种错误的观念,以为家庭教育可以无师自通,是自发的、本能的,其实这是一个很大的误区。

657、(×)职业道德规范对从业人员的劳动态度、职业责任、服务标准、操作规范、职业纪律等方面都有明确的规定,如有违反,要受到法律处分。

658、(√)生长发育是指个体从有生命开始,受遗传、环境、学习等因素影响,进行有顺序的、连续的、阶段性的、渐进的、有方向性的、由分化到完整的生理、心理变化的过程。

659、(√)大量研究发现,常饮咖啡或喝含咖啡因的饮料,对儿童身体健康不利。

660、(×)儿童食物过敏者中大约 50%是由偏食造成的。

661、(√)注意看食品的生产日期及保质期限,注意食品是否超过保质期。

662、(√)不得在公共场所燃放鞭炮,更不允许将点燃的鞭炮乱扔。

663、(√)1岁以后,随着年龄的增长,活动范围的扩大,会模仿越来越多的动作。

664、(√)一般来说,婴幼儿年龄越小代谢越旺盛。

665、(×)家长们认为,给孩子吃补品会促进生长发育,更希望通过它提高孩子的智力。

666、(√)接受+容许的放纵型家养方式下的儿童大多很不成熟,他们随意发挥自己,往往具有较强的冲动性和攻击性。

667、(√)拒绝+控制的专断型教养方式下的儿童常常表现出焦虑、退缩和不快乐。

668、(√)脂肪的膳食来源有以下几种途径:动物油、植物油、奶油、蛋黄、肉类、鱼类等,也可在一定条件下有摄入的糖类和蛋白质转化而来。

669、(×)维生素是一类有机化合物,是人体正常生命活动的一般营养素。

670、( ×) 适量摄入对于婴幼儿成长很有帮助, 过多摄入对机体无益, 还会影响钙、磷、氯等营养素吸收利用。

671、( √) 由于新生儿才离开母体, 胃肠道功能非常弱, 因此营养的来源主要靠母乳, 母乳是此期婴儿最佳的选择。

672、( √ ) 儿童计划免疫包括基础免疫和加强免疫, 是预防、控制和消灭相应传染病发生的关键措施。

673、( √) 计划免疫程序是通过大量科学试验而制定的, 有严格的操作程序, 不能随意更改。

674、( √) 长期进食精细食物, 不仅会因减少 B 族维生素的摄入而影响神经系统发育。

675、( √) 如果发现火灾发生, 最重要的是报警。

676、( √) 劳动者享有提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。

677、( √) 采取多种办法, 分流企业富余人员, 大力发展乡村企业, 吸纳更多农村剩余劳动力是劳动就业途径之一。

678、( √) 劳动者应当按照双方约定, 办理工作交接。

679、( √) 对有关婚配、生育保健等问题提供医学意见是婚前卫生咨询的内容。

680、( √) 婴儿大脑功能发育不全, 小脑发育晚。

681、( ×) 言语发生期三个阶段包括咿呀学语、自己说词和理解语言阶段。

- 682、( × ) 换乳期是婴儿生长过程的必然阶段,通常把婴儿舍弃乳类食物改食“辅食”的过程称为换乳期。
- 683、( √ ) 水在体内的交换取决于蛋白质和电解质浓度。
- 684、( × ) 年纪越小,按体表面积计算尿量越少。
- 685、( √ ) 穿过紧的衣服会限制婴儿动作技能发展。
- 686、( × ) 婴儿的胸围出生时是 32 厘米,第一年就增长 12 厘米。
- 687、( × ) 婴儿感冒、轻度低热等一般性疾病也可直接预防接种。
- 688、( × ) 出生体重在 2500~3999 克之间的婴儿是巨大儿。
- 689、( × ) 为了预防鹅口疮的发生,哺乳时母亲要保证乳头清洁,奶嘴、奶瓶要严格消毒,可以随意给婴儿服用抗生素。
- 690、( × ) 食品中的铅污染主要有爆米花、皮蛋、水果。
- 691、( √ ) 3 个月的婴儿的视线及头能跟随看到的物体转动 180 度,头转向声源。
- 692、( × ) 儿童的危险意识差,年龄越大,自我保护能力越差。
- 693、( × ) 家中门窗一定要装弹簧,方便上锁。
- 694、( √ ) 地板与楼梯都要防滑,以免婴儿滑倒。

695、(√)爬行是婴儿的内在需要和成长的重要方式,有利于婴儿的生长发育,因此,要鼓励婴儿爬行。

696、(×)育婴师不必定期体检就能工作。

697、(√)1.5岁的婴儿可以要求用手指指向物体,这样可以促进手指与大脑智慧活动的结合。

698、(×)对婴儿进行感觉统合系统练习时,成人一定要教给婴儿方法,这样可以达到事半功倍的效果。

699、(√)婴儿的情绪反应,主要是和他的基本生活需要是否得到满足相联系的。

700、(×)新生儿头长约占身长的1/2,成人则只占1/8。

701、(×)婴儿出生时乳牙尚未萌出,2-4个月开始出牙。

702、(√)断奶一般不会使婴儿痛苦或不适。

703、(×)婴儿食物过敏的常见症状是有湿疹、荨麻疹、便秘等。

704、(×)婴儿每天需水量的与饮食及天气温度并无直接关联。

705、(√)4个月的婴儿的视线及头能跟随看到的物体转动180度,头转向声源。

706、(√)一般每6个月为婴儿测量一次身高,每隔1-3个月测一次体重。

707、(×)新生儿接种卡介苗时,接种部位出现红肿,并形成肿块,后变软成小脓包,化脓,溃疡,这一些属于接种卡介苗的异常反应过程,需要及时与医生联系。

- 708、( ×)过多补充铁剂, 可以造成维生素 E 缺乏。
- 709、( ×) 婴儿缺乏维生素 E, 主要表现为口唇干裂, 血色素低, 眼结膜发白等。
- 710、( √) 婴儿长期接触铅, 会造成智力低下, 生长发育落后, 贫血容易感染疾病。
- 711、( √) 18 个月的婴儿能认识和指出身体部分, 听懂 50 个词左右, 会讲 10 个左右有意义的词。
- 712、( √) 婴儿容易发生意外伤害的因素主要是因为儿童的危险意识差, 好奇、好模仿, 生性活泼好动, 骨骼和皮肤薄弱与儿童逃避能力差。
- 713、( ×) 注意电饭锅、热水瓶、开水炉、电熨斗放置在婴儿可以拿到的位置。
- 714、( √ ) “第一反抗期” 是婴儿心理发展的必经阶段, 学会说 “不”, 是婴儿成长的标志。
- 715、( √) 劳动法规定从事母婴保健工作的人员, 应当严格遵守职业道德, 为当事人保守秘密。
- 716、( √) 7~12 个月, 表现出拍打、取物、抓握等动作是该年龄婴儿精细动作的发展特点。
- 717、( √) 社会性行为教育的核心是培养婴儿初步的社会交往能力。
- 718、( √) 1~3 岁以内婴儿发音不清晰属于正常的情况。
- 719、( ×) 新生儿已经有了社会性微笑。
- 720、( √ ) 婴儿皮肤的保护功能差 , 新陈代谢活跃, 体温调节能力差, 皮肤渗透作用弱。

- 721、(×) 知觉是反映当前客观事物的个别属性的认识过程。
- 722、(×) 全脂奶粉、新鲜牛奶和原奶都是适宜一岁内婴儿饮用的奶类。
- 723、(×) 儿童断奶后才能添加补充食物。
- 724、(√) 当发生婴儿水代谢紊乱时会出现水肿和脱水现象。
- 725、(×) 晚间加餐有助于促进婴儿睡眠。
- 726、(×) 消毒是消除或杀灭外环境中的一切微生物, 包括细菌的处理过程。
- 727、(×) 新生儿胸围 32 厘米, 比头围小 1-2 厘米, 一般在 12~36 个月时胸围与头围相接近。
- 728、(×) 有神经系统疾病者, 如癫痫、脑发育不全者, 特别不能注射乙肝疫苗。
- 729、(×) 婴儿缺乏维生素 B<sub>2</sub>, 主要表现为虚弱, 无力, 面色苍白, 脾气急躁等。
- 730、(√) 给婴儿洗澡时注意不要让水流入耳道内, 以免引起炎症。
- 731、(×) 铅尘大部分来自含铅汽油的燃烧, 部分来自于工业污染和含铅食物的摄入。
- 732、(×) 2 岁的婴儿能搭积木 8 块, 搭桥, 模仿画直线、横线。
- 733、(√) 家中窗户栏杆的间隔应小于 11 厘米, 窗下不放家具, 以免婴儿爬高。
- 734、(√) 为了让暖气管、暖气片更好的散热, 周围不要用护栏隔离。

735、(√)与家长沟通的立足点在于做到与家长建立和谐的关系,取得家长的信任。

736、(×)婴幼儿横托抱动作训练,做操时两手距离窄些,会更安全。

737、(×)一岁以内的婴儿如果肥胖可以喝脱脂奶粉。

738、(√)给婴儿添加猪肉可以预防贫血。

739、(×)宝宝如果不想吃饭,可以多喝点奶。

740、(×)婴幼儿不能吃动物肝脏,容易发生中毒。

741、(×)为婴幼儿选择发展听说能力的1岁以前的图书,在主要情节图的基础上,可以适当添加简单的背景,便于婴幼儿理解人物与背景的关系和变化。

742、(×)要尽量让婴幼儿多背诵我国传统文学,如三字经、古诗等。

743、(√)给婴儿喂饭时,最好让婴儿坐在餐椅里面。

744、(×)宝宝进餐时,成人可以给他讲故事,帮助他安静吃完。

745、(×)给婴儿喂辅食,最好把婴儿抱坐在身上。

746、(×)头围小的孩子肯定智力低下。

747、(×)脊灰疫苗是预防小儿麻疹的。

748、(√)育婴员要知道电源总开关的作用与位置,学会在紧急情况下关断总电源。

749、(√)水果与蔬菜都含有丰富的膳食纤维。

750、(×)从第8个月起,即可添加辅助食物。

751、(×)到3岁左右开始教孩子自己吃饭,就能很熟练了。

752、(×)1岁以后可以开始培养婴幼儿有规律地大小便。

753、(√)育婴员要对碗筷进行清洁消毒,不能将碗筷垒叠用消毒柜消毒。

754、(×)囟门大的孩子肯定是脑积水。

755、(×)体重的测量以斤和两为单位。

756、(×)儿童只能吃精瘦肉,不能吃肥肉。

757、(√)儿童测量坐高时大、小腿间应呈90°角。

758、(√)患鹅口疮可在医生指导下口服益生菌。

759、(√)一岁以后可以吃盐。

760、(√)婴幼儿主被动操练习,可以帮助婴幼儿学会与人交流及与社会合作的技巧。

761、(√)婴幼儿一般二岁会双足跳。

762、(×)被动操可以促进婴儿视觉的发育。

763、(×)婴幼儿横托抱动作训练,会增加腹部压力,造成腹泻。

764、(×)喂奶后 30 分钟之内或婴儿身体状况不佳时应该缓慢进行操节练习。

765、(√)语言环境是影响幼儿正确发音的重要因素。

766、(×)社会适应性能力就是人们对自己行为的控制能力。

### 单选题(767-1520)：

767、职业道德具有(D)的规范性。

A、操作      B、服务      C、态度      D、纪律

768、社会主义职业道德是以协调个人、集体和个人关系为核心的,离开(C),这三者之间的矛盾是无法协调的。

A、个人  
B、集体和个人  
C、集体主义  
D、集体

769、职业道德的内容表现为某一职业所形成的特有的(B)和习惯。

A、职业表现、职业特征、职业特色      B、职业心理、职业品质、职业传统  
C、职业心理、职业表现、职业特征      D、职业品质、职业传统、职业特征

770、0~3 岁婴幼儿是对周围的人建立信任感的关键期,是一种(C)情绪交往活动。

A、间接的  
B、可控的  
C、直接的  
D、不可控的

771、在个体发展过程中,会因为成熟出现(B)。

A、生长速度加快  
B、旧特征消失的现象

- C、 生长速度减慢
- D、 生长停滞现象

772、 机体柔嫩,生理调节和适应能力不成熟,平均每天睡眠长达 20 小时。易发生窒息、溶血、感染等 死亡率高,是(A)的特点。

- A、 新生儿期
- B、 婴儿期
- C、 幼儿期
- D、 学龄前期

773、 生长发育在一定范围内受先天和后天因素的影响而存在差异。因此婴幼儿生长发育是否正常应考虑( A)对个体的影响。

- A、 各种因素
- B、 先天因素
- C、 后天因素
- D、 环境因素

774、 年龄阶段性是指在婴幼儿心理发展的全过程中,表现出一些在( C)不同的年龄阶段特点。

- A、 形式上
- B、 数量上
- C、 质量上
- D、 内容上

775、 婴幼儿从 6 个月到 3 周岁左右,手在视野范围内完成操纵、摆弄物品的活动,都是各种(C)飞快发展 的时期。

- A、 想象能力
- B、 动手能力
- C、 感知觉能力
- D、 视觉能力

776、 1 岁以后的婴幼儿记忆过程缺乏(C)。

- A、 想象力
- B、 主动性
- C、 明确的目的
- D、 创造性

777、 (B)阶段主要产生的是人类的低级思维形式,即感知动作思维,又称直觉行动思维。

- A、 0~1 岁
- B、 1~3 岁
- C、 2~3 岁
- D、 3~4 岁

778、3岁以前的婴幼儿想象的内容也比较简单,一般是他所看到成人或其他大孩子的某个简单行为的重复,属于(B)的范围,缺乏创造性。

- A、再认
- B、再造想象
- C、创造想象
- D、回忆

779、1岁半的婴幼儿能集中注意(B)。

- A、1~2分钟
- B、2~3分钟
- C、3~5分钟
- D、5~7分钟

780、婴幼儿1岁左右,在活动过程中,通过(C)逐步认识作为生物实体的自我。

- A、自我评价
- B、自我监督
- C、自我感觉
- D、自我欣赏

781、人类在进化过程中所获得的基本情绪,大约有8~10种。它们是(C)。

- A、同时出现的
- B、先后出现的
- C、逐步出现的
- D、同步出现的

782、婴幼儿自己用言语来调节自己的行为,“我要”干什么,“我不要”干什么,这种具有明显独立性的行为更多的是在(C)阶段发生的。

- A、0~1岁
- B、1~2岁
- C、2~3岁
- D、3~4岁

783、婴幼儿早期已经表现出来的个人特点,就是气质。比如(B)。

- A、对人的面孔的喜爱
- B、睡眠规律、活动水平、是否爱哭、哭声大小
- C、喜欢让人抱
- D、手舞足蹈

784、语言发展期是从和(A)左右能说出第一批真正有意义的词开始。

- A、1岁
- B、2岁

- C、3岁
- D、4岁

785、最初的动作常常是全身的、笼统的、弥漫性的,以后才逐渐形成局部的、准确的、专门化的动作。是动作发展(B)的规律。

- A、从上部动作到下部动作
- B、从整体动作到分化动作
- C、从粗大动作到精细动作
- D、从大肌肉动作到小肌肉动作

786、婴儿在出生5~6月之后到第二年末,大脑仍在急剧的发展,并奠定一个重要的基础,需要(B)的支持。

- A、蛋白质
- B、营养素
- C、脂肪
- D、碳水化合物

787、婴幼儿每日营养素的需要量与成人不同,婴幼儿(A)。

- A、年龄愈小需要量相对愈高
- B、年龄愈大需要量相对愈高
- C、年龄愈小需要量相对愈低
- D、年龄愈大需要量相对愈低

788、婴幼儿所必需的营养素包括(A)。

- A、7种
- B、6种
- C、5种
- D、3种

789、儿童蛋白质供能占总能量的(D)。

- A、50-55%
- B、70-80%
- C、2-3%
- D、8-15%

790、婴幼儿脂肪的作用(D)。

- A、防止体热的消散
- B、保护脏器不受损伤
- C、有利于脂溶性维生素的吸收
- D、以上都是

791、碳水化合物能节省的(B )消耗量和协助脂肪氧化。

- A、脂肪
- B、蛋白质
- C、碳水化合物
- D、无机盐和微量元素

792、各种维生素有不同生理代谢功能,大多起调控作用,与酶关系密切,( D)。

- A、但都能提供能量,不能构成人体组织部分
- B、但都能提供能量,能构成人体组织部分
- C、但都不能提供能量,能构成人体组织部分
- D、但都不能提供能量,不能构成人体组织部分

793、膳食纤维主要有以下功能:( D )。

- A、预防胆结石、影响血糖水平
- B、预防结肠癌、助排便
- C、防止能量过剩及肥胖
- D、以上都是

794、若摄水量超过正常需要量,而心、肾、内分泌功能不全时,能发生( A)。

- A、水中毒
- B、水肿
- C、脱水
- D、脑水肿

795、母乳含有婴儿所需的各种免疫物质,可预防各种( A)疾病。

- A、感染性与传染性
- B、营养性
- C、神经性
- D、免疫性

796、儿童计划免疫有针对性地将生物制品接种到人体中,提高( B)的特异免疫力。

- A、患病者
- B、易感者
- C、儿童
- D、成人

797、计划免疫分为主动免疫和被动免疫, ( A )。

- A、 主动免疫免疫效果维持时间长, 被动免疫抗病力维持时间则短
- B、 主动免疫免疫效果维持时间长, 被动免疫抗病力维持时间也长
- C、 主动免疫免疫效果维持时间短, 被动免疫抗病力维持时间也短
- D、 主动免疫免疫效果维持时间短, 被动免疫抗病力维持时间则长

798、婴幼儿发热时不要接种( A )三联疫苗。

- A、 白喉、百日咳、破伤风
- B、 乙肝
- C、 麻风腮
- D、 肺炎

799、婴幼儿易患消化紊乱、腹泻、营养不良等疾病。因此, 应提倡纯母乳至少喂养到( B )个月。

- A、 4
- B、 6
- C、 8
- D、 12

800、幼儿每( B )月应进行一次体格检查。

- A、 1~3
- B、 3~6
- C、 6~12
- D、 9~12

801、婴幼儿洗澡水温应保持( D )。

- A、 30~32℃
- B、 33~35℃
- C、 35~36℃
- D、 37~40℃

802、尿布应选择( D )。

- A、 吸湿性强
- B、 透气性好
- C、 柔软
- D、 以上都是

803、新生儿头部已形成的乳痂, 可用煮熟后晾凉的( B )闷 24 小时, 再用棉棒轻轻擦拭。

- A、 食用动物油
- B、 食用植物油
- C、 肥皂水

D、 水

804、忌用樟脑球收藏衣服和物品,以防可能引起的婴幼儿(A )。

- A、 急性溶血性贫血
- B、 毒血症
- C、 败血症
- D、 坏血症

805、购买家用电器后要认真阅读产品说明书,注意使用(B )。

- A、 方法
- B、 电压和功率
- C、 标准
- D、 期限

806、家用电器的电源线绝缘破损时,要用(B )包扎好。

- A、 创可贴
- B、 绝缘胶布
- C、 伤湿止痛膏
- D、 药用胶带

807、如果发现有人触电,应(D ),使触电者马上脱离电源。

- A、 赶快切断电源
- B、 用干燥的木棍将电线挑开
- C、 用竹竿将电线挑开
- D、 以上都是

808、不要在电线上(D ),以防绝缘破损漏电造成触电。

- A、 放风筝
- B、 晒衣服
- C、 装设天线
- D、 以上都是

809、食品安全指食品(A )。

- A、 无毒、无害
- B、 无添加剂
- C、 符合一般营养要求
- D、 经过转基因处理

810、由于儿童发育还不完善,对有害物质的耐受性(B )。

- A、 较低
- B、 特别低 C、 较高
- D、 特别高

811、亲手为宝宝制作食品, ( A)较有保障。

- A、 安全性
- B、 质量
- C、 营养性
- D、 卫生

812、罐头食品中往往含有(D ),经常食用对人体有害。

- A、 调味品
- B、 甜味剂
- C、 防腐剂
- D、 以上都是

813、饮白开水不光能满足儿童对水的生理需要,还能为他们提供一部分(A )。

- A、 矿物质和微量元素
- B、 蛋白质
- C、 脂肪
- D、 碳水化合物

814、如果一味沉溺于甜味之中,儿童的味觉将发育不良,无法感受天然食物的清淡滋味,甚至影响到(A)的发育。

- A、 大脑
- B、 呼吸系统
- C、 消化系统
- D、 体格

815、铝过多可能导致儿童(D )。

- A、 智力下降
- B、 行为异常
- C、 不利于儿童骨骼及牙齿发育
- D、 以上都是

816、( D)等,多数产品在除去水中工业污染物时,也将水中的矿物质和微量元素去除一大部分。长期饮用,必然使人体某些矿物质或微量元素摄入不足。

- A、 蒸馏水
- B、 纯净水
- C、 太空水
- D、 以上都是

817、铬含量不足会使( D )。

- A、 胰岛素的活性减退
- B、 调节血糖的能力下降
- C、 造成近视
- D、 以上都是

818、膨化食品中普遍高盐、高味精,将使孩子成年后易导致(A )。

- A、 高血压和心血管病
- B、 高血脂
- C、 高胆固醇
- D、 糖尿病

819、儿童如果饮用了过多的咖啡因则会出现( D )等症状。

- A、 头疼、头晕、烦躁
- B、 心律加快
- C、 呼吸急促
- D、 以上都是

820、补品中含有激素和微量活性物质,对儿童正常的(B )有影响。

- A、 身高发育
- B、 生长发育
- C、 生理代谢
- D、 生理发育

821、大量研究资料显示,不科学的饮食作为一个致病因素,对儿童健康的影响并不比( D )小。

- A、 细菌
- B、 病毒
- C、 病原微生物
- D、 以上都是

822、五颜六色汽水除含一定的(A )外,几乎没有什么营养。

- A、 热量
- B、 蛋白质
- C、 脂肪
- D、 微量元素

823、注意看食品包装标识是否齐全,注意食品外包装是否标明(D )。

- A、 厂名
- B、 厂址
- C、 生产日期
- D、 以上都是

824、食品出锅后应立即吃掉,夏秋季节在室温下存放不应超过(C )。

- A、1 小时
- B、2 小时
- C、4 小时
- D、6 小时

825、婴幼儿安全防火基本要求(A )。

- A、 不得玩火
- B、 不得用火柴
- C、 不得点火
- D、 不得燃放鞭炮

826、纸张、木头或布起火时,可用(B )来扑救。

- A、 土
- B、 水
- C、 沙泥
- D、 干粉灭火器

827、火警电话的号码是(B )。

- A、 110
- B、 119
- C、 120
- D、 122

828、着火时身处楼房的,要注意(D )。

- A、 不要盲目乱跑
- B、 不要跳楼逃生
- C、 可以躲到居室里或者阳台上
- D、 以上都是

829、劳动者义务包括( A)等内容。

- A、 履行劳动合同,提高职业技能、执行劳动安全卫生规程
- B、 平等就业和选择职业、取得劳动报酬、休息、休假
- C、 获得劳动、安全、卫生保护
- D、 接受职业培训技能、享受社会保险和福利

830、劳动就业是指具有劳动能力的公民在( B)从事某种有一定劳动报酬或经营收入的社会职业。

- A、 任何年龄内
- B、 法定劳动年龄内 C、 特定年龄内

D、 所有年龄内

831、(C)是指劳动者与用人单位之间为确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议。

- A、 劳动权利
- B、 劳动义务
- C、 劳动合同
- D、 劳动就业

832、未成年工的特殊保护是指根据未成年工的生理心理和身体尚未定型的特点,对未成年工在劳动过程中(D)的保护。

- A、 人生安全
- B、 经济收入
- C、 休息时间
- D、 特殊权益

833、工资是指基于劳动关系,用人单位根据劳动者提供的(A),按照合同约定支付的货币报酬。

- A、 劳动数量和质量
- B、 劳动时间
- C、 计件数量
- D、 劳动数量

834、用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定(C)。

- A、 时间
- B、 报酬
- C、 服务期
- D、 工种

835、劳动者在解除或者终止劳动合同时应当按照双方约定,办理(A)。

- A、 工作交接
- B、 移交手续
- C、 交接手续
- D、 解除手续

836、《母婴保健法》第七条规定:“保健和医疗机构应当为公民提供婚前(C)”。

- A、 疾病治疗
- B、 生育状况检查
- C、 保健服务
- D、 心理指导

837、为胎儿生长发育进行定期监护,建立季、月、周联系卡,并及时提供咨询和医疗指导,是( C )的内容。

- A、 母婴保健指导
- B、 孕妇、产妇保健
- C、 胎儿保健
- D、 新生儿保健

838、《母婴保健法》第三十一条规定:医疗保健机构按照( D )卫生服务部门的规定,负责其职责范围内的母婴保健工作,建立医疗保健工作规范,提高医疗技术水平,采取各种措施方便群众,做好母婴保健服务工作。

- A、 县
- B、 市
- C、 省
- D、 国务院

839、未成年人隐私权是指未成年人享有的( B ),禁止他人非法干涉的权利。

- A、 个人缺点不被别人知晓
- B、 个人信息不被别人知晓
- C、 个人生活不被公众知晓
- D、 个人行为不被公众知晓

840、未成年人依法享有的、能够无偿取得死亡公民遗留的个人合法财产的权利。是未成年人享有的( D )。

- A、 财产所有权
- B、 受赠权
- C、 知识产权
- D、 继承权

841、我国( A )在規定对未成年人进行德育、智育、体育、美育、劳动教育的同时,还规定学校应对未成年人进行社会生活指导和青春期教育。

- A、 《未成年人保护法》
- B、 《母婴保健法》
- C、 《妇女权益保障法》
- D、 《劳动合同法》

842、在我国,( C )的未成年人,如果完成了规定年限的义务教育,不再继续升学的,依法可以从事有经济收入的劳动或者个体劳动。的权利。

- A、 12~16 周岁
- B、 16~17 周岁
- C、 年满 16 周岁、未满 18 周岁
- D、 17~18 周岁

843、婴幼儿食品是指满足婴幼儿(B )所需的食品。

- A、 断奶需要
- B、 正常生长发育
- C、 添加辅食
- D、 满足主食

844、储存、运输和装卸食品的容器包装、工具、设备和条件必须(B ),保持清洁,防止食品污染。

- A、 密封
- B、 安全、无害
- C、 隔离
- D、 防尘

845、食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐和加工的需要而加入食品中的(C)或者天然物质。

- A、 颜料
- B、 发酵剂
- C、 化学合成
- D、 化学物质

846、《中华人民共和国教育法》第二条指出：“在中华人民共和国境内的各级各类教育,适用本法。”所以(A)早期教育也适用本法。

- A、 0~3 岁
- B、 3~6 岁
- C、 1~6 岁
- D、 0~6 岁

847、学制系统内的学校和其他教育机构的设置、教育形式、修业年限、招生对象、培养目标等,由(D)或者由国务院授权教育行政部门规定。

- A、 县级政府
- B、 市级政府
- C、 省级政府
- D、 国务院

848、新鲜西红柿中不含有(D)。

- A、 维生素 C
- B、 维生素 B2
- C、 维生素 A
- D、 烟酸

849、果汁是水果经过压榨而去掉残渣制作的,加工过程会使水果的(B )。

- A、 水分丢失
- B、 营养成分损失
- C、 新鲜度降低
- D、 口感被破坏

850、(A)以下的儿童晚上8点左右睡觉最为适宜,如果入睡过晚,会影响到生长激素的分泌。

- A、 3岁
- B、 6岁
- C、 8岁
- D、 10岁

851、要做好(D),使婴幼儿生活规律,精神愉快。

- A、 动静活动结合
- B、 脑力与体力活动的结合
- C、 室内和室外活动的结合
- D、 以上都是

852、培养良好饮食习惯的注意事项:(D)。

- A、 进食的环境不太嘈杂,以免影响进食情绪
- B、 进食最好一次性喂饱,一次时间不要过长,不要让其含着嘴儿玩
- C、 进食的位置要固定,不边走路边进食
- D、 以上都是

853、睡眠过程中婴幼儿脑垂体分泌的生长激素比清醒状态时增加(C),有利于婴幼儿的生长发育。

- A、 1倍
- B、 2倍
- C、 3倍
- D、 4倍

854、餐前(C)不吃零食,以免影响婴幼儿的食量。

- A、 10分钟
- B、 20分钟
- C、 30分钟
- D、 60分钟

855、辅助婴幼儿进餐应注意:(D)。

- A、 不要边吃边玩
- B、 不挑食
- C、 不剩饭菜
- D、 以上都是

856、( C )就学会自己拿勺吃饭。

- A、半岁
- B、1岁
- C、1岁半
- D、2岁

857、筷子的使用较为困难,属于( D )。

- A、认知能力
- B、社会性行为
- C、大动作能力
- D、精细动作

858、婴幼儿睡前要求( D )。

- A、排一次尿
- B、避免过度兴奋
- C、口腔清洁
- D、以上都是

859、养成( D ),排便的习惯。

- A、每天早晨起床后
- B、午睡起床后
- C、临睡前
- D、以上都是

860、大人要细心观察,掌握婴幼儿大小便的规律:( D )。

- A、通常在什么时候大便
- B、小便前会有什么表情
- C、用“嘘”或“嗯”的声音建立条件反射
- D、以上都是

861、大部分婴幼儿( C )可以开始进行排便训练。

- A、半岁
- B、1岁
- C、1岁半
- D、2岁

862、身高受( D )的影响较明显。

- A、种族
- B、遗传
- C、环境
- D、以上都是

863、头围、胸围相等年龄大约是(A )。

- A、1岁
- B、2岁
- C、3岁
- D、4岁

864、婴幼儿(C )比例大于正常时,应考虑内分泌疾病或软骨发育不全等疾病。

- A、头部占身高
- B、颈部占身高
- C、坐高占身高
- D、躯干占身高

865、测卧式身长时让婴幼儿仰卧,双眼直视正上方,( D)贴紧测量板,双膝由测量人员压平。

- A、头和肩胛骨
- B、臀
- C、双足跟
- D、以上都是

866、婴幼儿正常腋温(B ),正常肛温 36.5~37.7℃范围内。

- A、35.8~36.8℃
- B、36~37℃
- C、36.2~37.2℃
- D、36.4~37.4℃

867、皮肤(D),是细菌生长繁殖的温床,还能堵塞毛囊口,影响皮肤的排泄作用。

- A、排出的皮脂、汗液
- B、皮肤本身脱落的上皮细胞
- C、周围环境中的尘土形成的污垢
- D、以上都是

868、由于脐部的解剖特点该处易出现细菌感染而发生(A ),因此新生儿脐部护理非常重要。

- A、脐炎
- B、脐疝
- C、坏血症
- D、溶血症

869、发热时身体容易排出更多的水分,应多给孩子喂(B )。

- A、热开水
- B、温开水

- C、含水量少的流质食物
- D、含水量少的半流质食物

870、物理擦浴退热过程应注意(D )。

- A、不要受凉
- B、保护好腹部
- C、擦浴完毕要擦干皮肤
- D、以上都是

871、如果婴幼儿的体温超过 39.4℃,可以采取用温水不间断地擦身体降温,并且每隔(D)量一次体温。

- A、60 分钟
- B、30 分钟
- C、20 分钟
- D、10 分钟

872、小儿口腔黏膜可见白色斑点,以颊部黏膜多见,但(D)都可受累。

- A、齿龈
- B、舌面
- C、上腭部
- D、以上都是

873、发生呕吐应观察的内容:(D)。

- A、呕吐物的色、量和性质
- B、呕吐的方式
- C、婴幼儿的精神状态
- D、以上都是

874、如果喂奶后(B)以上仍出现呕吐,且呕出物酸臭伴有食欲减退、疲乏等,可能伴有内、外科疾病,应到医院就诊。

- A、0.5 小时
- B、1 小时
- C、1.5 小时
- D、2 小时

875、先天性巨结肠表现为(C)。

- A、较少便秘
- B、不呕吐
- C、情绪不好
- D、偶尔哭

876、在孩子精神状态好,无其他伴随症状时,便秘可用( A )一下肚子。

- A、 顺时针按摩
- B、 逆时针按摩
- C、 热水袋等热敷
- D、 冷水袋等冷敷

877、识别脱水要点:( D )。

- A、 眼周围出现皱纹
- B、 眼睛有塌陷的感觉
- C、 眼泪少
- D、 以上都是

878、做好婴幼儿臀部的护理,洗后可涂些( C )药膏,以防红臀。

- A、 抗生素类
- B、 激素类
- C、 油脂类
- D、 凝胶类

879、除了大便次数,( D )等,都可判别是否便秘。

- A、 大便质地的软硬
- B、 排便时用力程度
- C、 排便时疼痛与否
- D、 以上都是

880、服用药物引起便秘原因:( D )。

- A、 肠道内益生菌增加
- B、 肠内环境变号,肠蠕动正常
- C、 pH 值下降
- D、 肠功能紊乱

881、( A )以上的婴儿就能建立定时排便规律。

- A、 3 个月
- B、 6 个月
- C、 8 个月
- D、 12 个月

882、婴儿嘴里长白膜多见于( A ),是白色念珠菌感染所致。

- A、 鹅口疮
- B、 地图舌
- C、 手足口病
- D、 疱疹性咽炎

883、患鹅口疮应将婴儿的食具如奶瓶、奶嘴、小勺、口杯等进行(B )处理。

- A、 灭菌
- B、 消毒
- C、 清洁
- D、 清洗

884、生理性黄疸孩子没有什么不适,第4~5天最黄,在第(C)消退。

- A、 2~3 星期
- B、 2 星期
- C、 1~2 星期
- D、 1 星期

885、符合下列情况之一的要考虑为病理性黄疸:(D )。

- A、 黄疸较深,连同足底、手心的皮肤也发黄
- B、 皮肤呈黄绿色,伴大便色泽变淡或呈灰白色如油灰状,同时小便深黄
- C、 生理性黄疸消退后,又重新出现皮肤黄染
- D、 以上都是

886、观察宝宝日常生活,只要宝宝出现(D )状况,就要及时去医院检查。

- A、 皮肤看起来愈来愈黄
- B、 精神疲乏及食欲差
- C、 嗜睡,容易尖声哭闹
- D、 以上都是

887、如果覆盖的纱布湿了或伴有渗液、渗血时,必须重新扎紧,用棉球,轻轻地从脐带根部向周围的皮肤擦洗(C)。

- A、 双氧水
- B、 碘伏
- C、 75%的酒精
- D、 95%的酒精

888、脐带一旦被水或被尿液浸湿,要马上应用干棉球或干净柔软的纱布擦干,然后用(C)消毒。

- A、 碘酊棉球
- B、 碘伏棉球
- C、 75%酒精棉签
- D、 95%酒精棉签

889、用75%酒精浸湿的棉签,以从脐带根部到脐带再到周围皮肤的先后顺序(A)擦拭。

- A、 从内到外

- B、 从外到内
- C、 来回
- D、 上下

890、由于脐带脱落的表面还没有完全长好,肉芽组织里的液体渗出所致,用75%的酒精轻轻擦干净即可,一般1天1~2次即可,(C)后脐窝就会干燥。

- A、 6~7天
- B、 4~5天
- C、 2~3天
- D、 1~2天

891、尿布疹的原因有:(D)。

- A、 粪便引起
- B、 霉菌引起
- C、 细菌引起
- D、 以上都是

892、适宜的尿布包括:(D)。

- A、 合格的一次性尿布
- B、 柔软的棉布
- C、 吸水性强的纱布
- D、 以上都是

893、得了湿疹的孩子会感到患处刺痒,因而会(D)。

- A、 焦躁不安
- B、 哭闹不止
- C、 影响睡眠
- D、 以上都是

894、湿疹的护理的要点:根据医生要求进行涂药(D)。

- A、 不用刺激性止痒药
- B、 保持皮肤清洁
- C、 避免感染
- D、 以上都是

895、保持好药品和化学品容器上原有的(B)。

- A、 刻度
- B、 标签
- C、 有效期
- D、 说明书

896、用( D)暖气片或暖气管,避免婴幼儿烫伤。

- A、毛巾盖好
- B、家具挡住
- C、防护栏隔离
- D、以上都行

897、电(热)加热器应安在婴幼儿(D )的墙上。

- A、够不着
- B、摸不到
- C、拿不到
- D、以上都是

898、把婴幼儿放在水里前,一定要先用( D)试好温度。

- A、手肘
- B、手腕
- C、水温计
- D、以上都是

899、不把(D )放在婴幼儿能够到的地方。

- A、洗涤剂
- B、含酒饮料
- C、碘伏
- D、以上的是

900、家具一定要(B ),以防孩子把家具弄翻。

- A、结实
- B、固定好
- C、靠墙
- D、以上都是

901、指导婴幼儿精细动作(抓捏黄豆、花生等小物品)时,每次只能放下( A),并且成人应严格看护。

- A、一粒
- B、二粒
- C、三粒
- D、四粒

902、玩绳子时,教育幼儿不可将绳子套住( A)。

- A、脖子
- B、腰部
- C、手腕
- D、脚踝

903、结伴外出时,不要相互( D )。

- A、 追逐
- B、 打闹
- C、 嬉戏
- D、 以上都是

904、穿越马路要听从交通民警的指挥,要遵守交通规则,做到(A )。

- A、 “绿灯行,红灯停”
- B、 “黄灯行,红灯停”
- C、 “绿灯停,红灯行”
- D、 “黄灯停,红灯行”

905、交通信号灯规则:(C )。

- A、 红灯亮时车辆、行人通行
- B、 绿色箭头灯亮时不准许车辆按箭头所示方向通行
- C、 黄灯闪烁时车辆、行人在确保安全的原则下可以通行
- D、 黄灯闪烁时车辆、行人必须停止通行

906、口对口急救步骤:先将婴幼儿的头部略向后倾( B)左右,以使其呼吸道畅通,检查喉内有无异物。

- A、 10°
- B、 15°
- C、 20°
- D、 25°

907、呼吸道异物,如处理不当或处理不及时,能造成婴儿( A)。

- A、 窒息死亡
- B、 肺炎
- C、 气管炎
- D、 呛咳

908、被宠物咬伤后,可注射(D )。

- A、 狂犬病血清
- B、 破伤风抗毒素
- C、 狂犬疫苗
- D、 以上都是

909、婴幼儿做主被动操时,要少穿些衣服,注意(D )。

- A、 动作要到位
- B、 速度要快些

- C、 要进行眼神对视
- D、 不要操之过急,要循序渐进

910、 婴幼儿的被动操扩胸运动注意事项:两臂分开时(C ),胸前交叉时放松。

- A、 不要用力
- B、 要用力
- C、 稍微用力
- D、 要用大力

911、 婴幼儿 2~3 岁时,通过模仿操练习,以达到增强婴幼儿(D )的目的。

- A、 信心
- B、 主动性
- C、 模仿能力
- D、 运动协调性

912、 为婴幼儿选择发展听说能力的图片,图片最好(A )。

- A、 没有背景
- B、 有一些背景
- C、 有简单背景
- D、 有丰富背景

913、 ( B)的婴幼儿视听神经尚未发育成熟,对动态的画面和快速的播音无法正常接收。

- A、 1 岁以前
- B、 2 岁以前
- C、 3 岁以前
- D、 4 岁以前

914、 从新生儿开始,就要坚持与宝宝说话,要采取( B)的姿势。

- A、 背靠背
- B、 面对面
- C、 近距离
- D、 远距离

915、 婴幼儿依靠(D )去收集信息。

- A、 手
- B、 脚
- C、 身体
- D、 眼、耳、鼻、舌、身等感觉器官

916、 在同一个时间,宝宝的认知内容只能有( A)。

- A、 一个对象
- B、 二个对象
- C、 三个对象
- D、 四个对象

917、当宝宝边听音乐边自由地扭动身体时,大人要( D)。

- A、 及时给予指导
- B、 及时地给予示范
- C、 不予理睬
- D、 参与到孩子的活动中,及时喝彩鼓励

918、采用模仿表现法时,宝宝的模仿动作( C)。

- A、 要逼真
- B、 要夸张
- C、 不要求精确
- D、 要专业

919、让宝宝模仿涂鸦时,成人( C)。

- A、 既提供示范,也进行纠正
- B、 要指出不正确的
- C、 只提供示范,不进行纠正
- D、 不提供示范,要手把手地教

920、婴幼儿用啼哭对不适作出反应是一种(C)表现。

- A、 交往需要
- B、 表达需要
- C、 生存需要
- D、 生理需要

921、在语言尚未建立前,婴儿与成人的交往主要是(A)的交往。

- A、 情绪
- B、 表达
- C、 运动
- D、 思维

922、当婴幼儿能够(C)后,要及时对他的言行加以肯定和赞赏。

- A、 自己走路
- B、 自己吃饭
- C、 听懂语言
- D、 自己玩玩具

923、婴幼儿社会性发展需经历(D ) 等过程。

- A、 亲子关系
- B、 同伴关系
- C、 集体关系
- D、 以上都是

924、经常带婴幼儿到街心公园参与同伴的活动,与同伴一起背诵儿歌,做游戏等。可以( B)。

- A、 增进友谊
- B、 克服害羞
- C、 产生自卑
- D、 产生焦虑

925、母亲在喂奶时可以一边喂,一边抚摸宝宝,有利于(A )的建立。

- A、 亲子关系
- B、 同伴关系
- C、 群体关系
- D、 朋友关系

926、帮助婴幼儿准备与同伴一起玩的玩具,如积木、图书、水盆等,可以促进(B )的建立。

- A、 亲子关系
- B、 玩伴关系
- C、 群体关系
- D、 朋友关系

927、在婴幼儿第一“反抗期”,对待婴幼儿不合理的要求或有危险的活动,应当尽量避免正面冲突,可采取适当转移注意力的办法进行软处理。这是( A)。

- A、 转移注意法
- B、 合理满足法
- C、 故意冷淡法
- D、 后果惩罚法

928、职业道德是指从事一定职业的人,在( B)中,应该遵循的与其职业活动紧密联系的道德规范的总和。

- A、 社会
- B、 工作或劳动过程
- C、 家庭
- D、 公共场所

929、职业道德具有( A)的约束性。

- A、 行为
- B、 服务

- C、 态度
- D、 纪律

930、职业道德的重点是解决( C)问题。

- A、 个人态度
- B、 个人报酬
- C、 劳动态度
- D、 劳动报酬

931、《标准》中对育婴员职业能力特征的要求是“有爱心、耐心和责任心;身体健康;口齿清楚,会讲普通话;( B)具有学以致用的能力。”

- A、 能说会道
- B、 观察敏锐,操作灵活,
- C、 胆大心细
- D、 心灵手巧

932、通过婴幼儿的体格生长评价,可以了解到儿童的(A )。

- A、 营养状态
- B、 生活环境
- C、 卫生状态
- D、 教养的水平

933、育婴员面对的是( B)尚未发育成熟的婴幼儿,他们的行为、情绪反复多变,语言表达能力、情绪控制能力都处于发展过程中。

- A、 3-6 岁
- B、 0~3 岁
- C、 1-3 岁
- D、 2-6 岁

934、婴幼儿头占身长( A)。

- A、 1/4
- B、 1/2
- C、 1/8
- D、 1/6

935、学习走路、学习食用固体食物、学习说话、学习控制排泄机能,是婴幼儿(B )。

- A、 学习的任务
- B、 生长发育的任务
- C、 养育的任务
- D、 游戏的任务

936、( B)的特点是:生长发育迅速,营养要求高,以乳食为主,但消化功能差,易发生消化紊乱和营养不良。

- A、 新生儿期
- B、 婴儿期
- C、 幼儿期
- D、 学龄前期

937、婴幼儿心理发展的每一年龄阶段特点,都具有相对的稳定性。从前一阶段向后一阶段过渡的时间可能略有早晚,但阶段( A)。

- A、 不能跳跃,顺序是一致的
- B、 可以跳跃,顺序是不一致的
- C、 不能跳跃,顺序是不一致的
- D、 可以跳跃,顺序是一致的

938、人如果没有( A),就不可能累积经验和增长知识。

- A、 记忆
- B、 想象
- C、 气质
- D、 意志

939、感知动作思维是指思维过程离不开(DD)的思维方式。

- A、 实物
- B、 表象
- C、 情景
- D、 直接感知的事物和操纵事物的动作

940、婴儿( D)时能够比较稳定地注视某一物体,但持续的时间很短。

- A、 1~2 个月
- B、 2~3 个月
- C、 3~4 个月
- D、 5~6 个月

941、0~1 岁阶段主要建立的是( A)关系。

- A、 亲子
- B、 玩伴
- C、 朋友
- D、 群体

942、自我意识是意识的一个方面。包括自我感觉、自我评价、自我监督、自尊心、自信心、自制力、独立性等。它的发展是人的( B)的重要标志之一。

- A、 心理特征

- B、 个性特征
- C、 思想意识
- D、 道德品质

943、0~3岁婴幼儿的情绪和情感,对其( B )起着至关重要的作用。

- A、 性格发展
- B、 生存与发展
- C、 动作发展
- D、 认知发展

944、新生儿的行爲主要受本能的反射支配,没有(A )。

- A、 意志力
- B、 主动性
- C、 积极性
- D、 协调性

945、气质是儿童神经反应的特征。既涉及个人的先天特性,也受环境、人际关系、接受刺激和活动条件的影响。气质既是(B )。

- A、 稳定的,不变的
- B、 稳定的,可变的
- C、 不稳定的,可变的
- D、 不稳定的,不可变的

946、( A )为言语的发生期。包括咿呀学语,开始听懂别人说的话和自己说话三个阶段。

- A、 0~1岁
- B、 1~2岁
- C、 2~3岁
- D、 3~4岁

947、婴儿首先出现的动作是抬头,其后才逐步发展到俯撑、翻身、坐、爬、站立、行走。这是动作发展(A )的规律。

- A、 从上部动作到下部动作
- B、 从整体动作到分化动作
- C、 从粗大动作到精细动作
- D、 从大肌肉动作到小肌肉动作

948、婴儿体内营养素的( C )。

- A、 储备量相对大,适应能力也低
- B、 储备量相对小,适应能力也高
- C、 储备量相对小,适应能力也低
- D、 储备量相对大,适应能力也高

949、婴幼儿期基础代谢所需能量占总能量的( D )。

- A、 20%-30%
- B、 30%-40%
- C、 40%-50%
- D、 50%-60%

950、蛋白质用于婴幼儿维持(A )。

- A、 各种组织新陈代谢
- B、 体温
- C、 血糖水平
- D、 营养运输

951、婴幼儿长期脂肪缺乏会容易发生(A )。

- A、 脂溶性维生素缺乏症
- B、 体重和身高增加增快
- C、 腹泻、酸中毒
- D、 食欲减退、消化不良

952、膳食纤维没有( A)功能。

- A、 预防缺铁性贫血
- B、 预防结肠癌、助排便
- C、 防止能量过剩及肥胖
- D、 预防胆结石、影响血糖水平

953、婴幼儿水的需要量约为( B)mL/(kg·d)。

- A、 50~100
- B、 100~150
- C、 150~200
- D、 200~250

954、疫苗多是用病菌、病毒或其产生的毒素制成的,经过杀灭或减毒处理,有一定的(B ),接种后可引起一些反应。

- A、 药性
- B、 毒性
- C、 刺激性
- D、 免疫性

955、腹泻时不要接种(B )疫苗。

- A、 卡介苗
- B、 小麻糖丸

- C、乙脑
- D、流脑

956、百白破疫苗不能预防(B )传染病。

- A、白喉
- B、白癜风
- C、百日咳
- D、破伤风

957、婴幼儿自(D )开始可添加辅食,为断离母乳作准备。

- A、2-3个月
- B、3-4个月
- C、4-5个月
- D、6个月

958、自我生活能力包括(D )等。

- A、睡眠、进食
- B、排便、沐浴
- C、游戏、户外活动
- D、以上都是

959、婴幼儿使用的肥皂、浴液、爽身粉、婴幼儿油等应当没有(B )。

- A、香味
- B、刺激性
- C、安全
- D、药性

960、婴幼儿皮肤护理的注意事项:( A)。

- A、奶量充足时口腔是清洁的,禁忌用纱布擦洗口腔黏膜
- B、奶量充足时口腔是有菌的,禁忌用纱布擦洗口腔黏膜
- C、奶量充足时口腔是清洁的,可以用纱布擦洗口腔黏膜
- D、奶量充足时口腔是有菌的,可以用纱布擦洗口腔黏膜

961、婴幼儿衣服有条件的( A)更换一次。

- A、每天
- B、隔天
- C、2-3天
- D、每周

962、在不超过( D)的允许负荷的情况下,方可使用购买的家用电器。

- A、 家庭电源插座
- B、 保险丝
- C、 电表和导线
- D、 以上都是

963、安装家用电器时,要注意电器的使用环境。不要将家用电器安装在(D )的环境中。

- A、 干燥
- B、 无热源
- C、 无灰尘
- D、 有易燃和腐蚀性气体

964、使用电热设备应注意:(D )。

- A、 应有自身的开关操作
- B、 严禁用插头操作
- C、 插座的容量应满足要求
- D、 以上都是

965、电线断线落地,不要靠近,6~10kV 的高压线,应至少离开电线落地点(C )远,并及时报告有关部门修理。

- A、 3m
- B、 5m
- C、 10m
- D、 15m

966、教给婴幼儿使用电器方法:(A)。

- A、 教育婴幼儿注意安全
- B、 乱动电器的没有危害
- C、 可以随意摆弄电器设备
- D、 允许婴幼儿在没有成人的指导下使用

967、根据世界卫生组织的定义,食品安全是“食物中(B)对人体健康影响的公共卫生问题”。

- A、 添加剂
- B、 有毒、有害物质
- C、 转基因分子
- D、 以上都是

968、根据不同月龄婴幼儿的发育特点,选择合适的食物(D),使婴幼儿保持良好的食欲,获得充足的营养。

- A、 品种
- B、 质地
- C、 口味
- D、 以上都是

969、烧开的自来水冷却到( B),此时水的生物活性增加,最适合人的生理需要。

- A、 35~45℃
- B、 25~35℃
- C、 15~25℃
- D、 5~15℃

970、过食冷饮会引起儿童( D)。

- A、 胃肠道内温度骤然下降
- B、 局部血液循环减缓
- C、 影响对食物中营养物质的吸收和消化
- D、 以上都是

971、若常饮易拉罐饮料,必然造成( C)摄入过多。

- A、 铜
- B、 铅
- C、 铝
- D、 锡

972、检测显示,膨化食品虽然口味鲜美,但从成分结构看,属于( D )的食品。

- A、 高油脂
- B、 高热量
- C、 低粗纤维
- D、 以上都是

973、咖啡因还会破坏儿童体内的维生素,引起( B )。

- A、 维生素 C 缺乏症
- B、 维生素 B1 缺乏症
- C、 维生素 B2 缺乏症
- D、 维生素 B6 缺乏症

974、儿童不宜食用的营养滋补剂包括:含有( D)等营养品。

- A、 人参、鹿茸
- B、 阿胶
- C、 冬虫夏草、花粉
- D、 以上都是

975、长期偏食某种食物,会导致某些“毒性”成分在体内( C)。

- A、 聚集
- B、 扩散

- C、蓄积
- D、丢失

976、食品中的添加剂“三精”指(D )。

- A、糖精
- B、香精
- C、食用色精
- D、以上都是

977、购买肉制品、腌腊制品慎购(C )的食品。

- A、规范的市场
- B、展销会
- C、游商(无固定营业场所、推车销售)销售
- D、“放心店”

978、许多生的食品,特别是家禽、肉类及未经消毒的牛奶常被(D )污染,彻底加热可杀灭。

- A、细菌
- B、病毒
- C、寄生虫
- D、病原体

979、不得随意点火,禁止在(D )用火。

- A、仓库
- B、加油站
- C、易燃易爆物品处
- D、以上都是

980、炒菜时油锅起火,迅速将锅盖紧紧盖上,使锅里的油火因缺氧而熄灭,不可用( A)扑救。

- A、水
- B、土
- C、沙泥
- D、干粉灭火器

981、如果发现火灾发生,最重要的是报警,这样才能(D )。

- A、及时扑救
- B、控制火势
- C、减轻火灾造成损失
- D、以上都是

982、一旦身受火灾威胁要根据周围的( D)等分析判断火势,不要盲目采取行动。

- A、 烟
- B、 火光
- C、 温度
- D、 以上都是

983、履行劳动合同,提高职业技能,执行劳动安全卫生规程,遵守劳动职业道德是( B )的内容。

- A、 劳动权利
- B、 劳动义务
- C、 劳动争议
- D、 劳动就业

984、劳动者竞争就业原则、照顾特殊群体人员的原则、禁止未成年人就业的原则是( D )的内容。

- A、 劳动权利
- B、 劳动义务
- C、 劳动争议
- D、 劳动就业原则

985、( B )的内容包括劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任等。

- A、 劳动权利
- B、 劳动合同
- C、 劳动就业
- D、 劳动义务

986、用人单位与劳动者约定服务期的,不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的( B )。

- A、 职务
- B、 劳动报酬
- C、 待遇
- D、 声誉

987、用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具( B ),并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。

- A、 此人曾在本单位工作的证明
- B、 解除或者终止劳动合同的证明
- C、 失业证明
- D、 就业证明

988、国家保障妇女享有与男子平等的( C )。

- A、 人生权利
- B、 经济权利
- C、 政治权利

D、 生存权利

989、对准备结婚的男女双方,可能患影响结婚和生育的疾病进行医学检查是( D)的内容。

- A、 婚前卫生指导
- B、 婚前卫生咨询
- C、 婚前心理指导
- D、 婚前医学检查

990、《母婴保健法》第三十四条规定:从事母婴保健工作的人员,应当严格遵守职业道德,为当事人( B)。

- A、 尽心尽责
- B、 保守秘密
- C、 维护利益
- D、 出谋献策

991、未成年人接受的赠款、赠物归属未成年人所有。任何人,包括未成年人的父母或其他监护人,不得以该未成年人未成年为由将该款、物据为己有。是未成年人享有的( B)。

- A、 财产所有权
- B、 受赠权
- C、 知识产权
- D、 继承权

992、我国《未成年人保护法》在規定对未成年人进行德育、智育、体育、美育、劳动教育的同时,还规定学校应对未成年人进行( D)。

- A、 才艺教育
- B、 劳动教育
- C、 生活教育
- D、 社会生活指导和青春期教育

993、主食品系指含有婴幼儿生长发育所需的营养素的( A)。

- A、 主要食品
- B、 辅助食品
- C、 添加食品
- D、 补充食品

994、食品生产经营人员销售直接入口食品时,必须使用( D )。

- A、 手套
- B、 塑料袋
- C、 夹子
- D、 售货工具

995、不符合卫生标准和卫生管理办法的食品添加剂,不得( D)。

- A、 出售
- B、 买卖
- C、 上市
- D、 经营、使用

996、教育是社会主义现代化建设的基础,国家保障教育事业(D )。

- A、 提前发展
- B、 同步发展
- C、 稳步发展
- D、 优先发展

997、合理的作息可以维持婴幼儿的( D)的功能平衡。

- A、 呼吸系统
- B、 消化系统
- C、 泌尿系统
- D、 内分泌系统

998、婴幼儿消化系统功能未发育成熟, (B )。

- A、 消化能力强,胃的容量小
- B、 消化能力弱,胃的容量小
- C、 消化能力强,胃的容量大
- D、 消化能力弱,胃的容量大

999、( B)就可以自己捧着杯子喝水,刚开始每次在杯里只倒一点水,然后试着用手扶着让孩子喝。

- A、 1岁
- B、 1岁半
- C、 2岁
- D、 2岁半

1000、了解婴幼儿大小便的规律,培养婴幼儿定时大便,自己主动坐盆的良好习惯,从小进行常规性训练,可养成婴幼儿有规律的( D)习惯,帮助婴幼儿建立自信心。

- A、 排便
- B、 生活
- C、 卫生
- D、 以上都是

1001、( C)吃饭动作逐渐协调,可独立吃饭。

- A、 1~1.5岁
- B、 1.5~2岁
- C、 2~3岁

D、 3~4 岁

1002、睡前( C ),更不可用喂哺催眠。

- A、 不拍
- B、 不摇
- C、 不抱
- D、 以上都是

1003、婴幼儿会( C )后,白天就不要用尿布。

- A、 坐
- B、 站
- C、 走
- D、 跑

1004、新生儿出生时体重约为 3kg, 生后( C )天可出现生理性体重下降, 生后 7~10 天恢复到出生时体 重。

- A、 5~7
- B、 3~5
- C、 2~3
- D、 1~2

1005、新生儿出生时胸围小于头围 1~2cm, 一般在( B )胸围赶上头围。

- A、 1 岁前
- B、 1 岁后
- C、 1.5 前
- D、 1.5 岁后

1006、婴幼儿坐高占身高比例大于正常时, 应考虑( D )等疾病。

- A、 神经系统
- B、 消化吸收不良
- C、 遗传
- D、 内分泌疾病或软骨发育不全

1007、均值离差法划分为 6 个等级, 评价为“中下”的标准是:( D )。

- A、 为均值加 2 个标准差以上
- B、 为均值加 1 个标准差到均值加 2 个标准差之间
- C、 为均值到均值加 1 个标准差之间
- D、 均值到均值减 1 个标准差之间

1008、婴幼儿低热范围:( A )。

- A、 37.5~38℃
- B、 37.5~38.2℃
- C、 37.5~38.5℃
- D、 37.5~39℃

1009、如果婴幼儿的体温超过( C ),可以采取用温水不间断地擦身体降温,并且每隔 10 分钟量一次体温。

- A、 37.4℃
- B、 38.4℃
- C、 39.4℃
- D、 40.0℃

1010、如果喂奶后 1 小时以上仍出现呕吐,且伴有( D )等,可能伴有内、外科疾病,应到医院就诊。

- A、 呕出物酸臭
- B、 食欲减退
- C、 疲乏
- D、 以上都是

1011、胆道蛔虫症表现为,( A )。

- A、 面色苍白或带黄
- B、 偶尔发作
- C、 不绞痛
- D、 不呕吐

1012、因便秘或感冒引起的轻度腹痛,可用手掌置于孩子腹部进行顺时针按摩,持续(A )分钟。

- A、 3~5
- B、 5~8
- C、 8~10
- D、 10~15

1013、识别脱水要点:(D )。

- A、 精神疲乏
- B、 无力
- C、 粘膜干燥
- D、 以上都是

1014、婴幼儿腹泻时应密切观察婴幼儿的(D )。

- A、 脸色及精神状态
- B、 排便的次数
- C、 排出物的性状
- D、 以上都是

1015、治疗婴幼儿( A)可用制霉菌素溶液涂患处,每日 3~4 次。

- A、 鹅口疮
- B、 口腔溃疡
- C、 疱疹性咽峡炎
- D、 外伤

1016、患口炎的婴儿拒绝吸奶时可用(A )喂。

- A、 小勺
- B、 杯子
- C、 小碗
- D、 奶瓶

1017、早产儿的生理性黄疸会( D)。

- A、 出现得较迟
- B、 程度较重
- C、 持续较久
- D、 以上都是

1018、新生儿从医院回家后,无特殊情况,如无脐部感染,则可不用(B )。

- A、 保持脐部干燥
- B、 纱布覆盖
- C、 任何处理
- D、 75%酒精消毒脐部

1019、准备婴儿脐敷料:( D)。

- A、 消毒棉签
- B、 75%的酒精
- C、 纱布
- D、 以上都是

1020、霉菌引起的尿布疹的症状:( B)。

- A、 皮肤呈烫伤样大水泡
- B、 在发红的皮肤上散布红点
- C、 皮肤出现风团疹
- D、 皮肤有脓性分泌物

1021、集体外出时,最好(D )行走。

- A、 有组织
- B、 有秩序
- C、 列队

D、 以上都是

1022、 穿越马路要(D )。

- A、 走人行横道线
- B、 自觉走过街天桥
- C、 走地下通道
- D、 以上都是

1023、 乘坐公共汽车时, 不得把(B )带入车内。

- A、 食物
- B、 汽油、 爆竹等易燃易爆的危险品
- C、 宠物
- D、 婴儿车

1024、 气管异物急救合适的方法是(D )。

- A、 将婴儿倒置
- B、 头向下
- C、 拍击背部
- D、 以上都是

1025、 婴幼儿做主被动操时动作要( B)。

- A、 到位
- B、 柔软而有节奏
- C、 有力
- D、 快速

1026、 婴幼儿的被动操屈伸运动, 预备姿势是婴儿(C ), 使婴儿两腿伸直, 放松。

- A、 侧卧
- B、 俯卧
- C、 仰卧
- D、 跪式

1027、 婴幼儿的主被动操横托抱, 可以增加腹部压力, 促进( C)成熟和大便通畅。

- A、 肝脏
- B、 胆囊
- C、 肠胃
- D、 脾脏

1028、 在进行婴幼儿的主被动操横托抱时, 要细致观察婴儿( B)。

- A、 床铺的安全性

- B、 身体和情绪状况
- C、 手脚活动情况
- D、 大便的颜色

1029、 在进行婴幼儿的主被动操起立运动时,扶婴儿站起后,再( D)。

- A、 直接起立
- B、 由立到跪
- C、 由跪到立
- D、 由跪到俯卧

1030、 在进行婴幼儿的主被动操弯腰运动时,在婴儿前方放一玩具,使婴儿弯腰前倾,拣桌(床)上玩具。拣起玩具后成(C)。

- A、 弯腰状态
- B、 后仰状态
- C、 直立状态
- D、 前弓状态

1031、 在进行婴幼儿的主被动操跳跃运动时,把婴儿托起离开桌(床)面(让婴儿足尖着地)( C)跳跃。

- A、 快速
- B、 慢速
- C、 轻轻
- D、 用力

1032、 为( B)婴幼儿选择发展听说能力的图书没有背景,只有人物的动态和表情,排除干扰。

- A、 1岁以前
- B、 1~2岁
- C、 2~3岁
- D、 3~4岁

1033、 给婴幼儿玩节律游戏也可以用简单的节奏乐器进行游戏,如( D),以增加气氛和提高婴幼儿参加活动的乐趣。

- A、 使用大型架子鼓
- B、 使用乐队的大鼓
- C、 使用专用的乐器
- D、 铃铛、串铃、响板、沙锤等

1034、 婴幼儿认知水平与感觉器官对应的(C)发育速度有关。

- A、 手
- B、 脚
- C、 大脑神经中枢
- D、 语言

1035、宝宝在优美的韵律中感受节奏的美,通过( B),可以让宝宝充满自信和快乐。

- A、 思维
- B、 肢体的运动
- C、 想象
- D、 语言

1036、采用模仿表现法时,宝宝的模仿动作只要(B )就可以了。

- A、 标准
- B、 有模仿的意识
- C、 规范
- D、 专业

1037、小儿 2 岁时能叠 6-7 块积木,能(D )。

- A、 模仿画垂直线
- B、 拿勺子吃饭
- C、 一页一页的翻书
- D、 以上都是

1038、让宝宝模仿涂鸦时,要从( A)入手。

- A、 最简单的
- B、 最新奇的
- C、 最丰富的
- D、 最复杂的

1039、婴幼儿从出生到 1 岁期间是情绪萌发期,( C)的婴幼儿会对新鲜事物敏感,趋向于探索外界,为智力发展打下良好基础。

- A、 经常生气
- B、 经常哭泣
- C、 经常快乐
- D、 经常发愣

1040、在婴幼儿刚会走路时摔倒后要鼓励不哭;在遇到别人抢夺玩具时学会暂时让步;在别的小朋友哭时产生同情心,这是培养婴儿的( D)。

- A、 独占和自私
- B、 爱心
- C、 冷漠
- D、 安慰和宽容性

1041、要面对面地与婴幼儿说话,吐字要清晰,节奏要缓慢,可以提高婴幼儿的(C )能力。

- A、 动作
- B、 认知
- C、 沟通
- D、 辨别

1042、职业道德是指从事一定职业的人,在工作或劳动过程中,应该遵循的与其职业活动紧密联系的( A )。

- A、 道德规范的总和
- B、 道德
- C、 规范的总和
- D、 道德的总和

1043、职业道德可以提高行业的( C )。

- A、 知名度
- B、 可信度
- C、 信誉度
- D、 规范度

1044、形成社会与个体的简单概念,是婴幼儿( A )。

- A、 生长发育的任务
- B、 游戏的任务
- C、 养育的任务
- D、 学习的任务

1045、( C )具有以下特点:乳牙逐渐出齐,食物转换但消化功能弱;语言、动作及思维发展迅速,活动范围扩大,但危险识别和自身保护力差,易发生事故;免疫力仍低,传染病发生率高。

- A、 新生儿期
- B、 婴幼儿期
- C、 幼儿期
- D、 学龄前期

1046、感觉包括( D )、皮肤感知觉。

- A、 视觉
- B、 听觉
- C、 嗅觉和味觉
- D、 以上都是

1047、( C )婴幼儿在不断扩大生活范围、不断增长社会经验和能力,不断发展言语的过程中,逐步把握 作为一个社会人的自我。

- A、 从出生到一岁
- B、 从一岁到两岁
- C、 从第二年到满 3 岁

D、 从3岁到4岁

1048、婴幼儿的情绪更多受( B)的影响。

- A、 主观心态
- B、 外在环境变化
- C、 他人心态
- D、 生态环境

1049、在( A)阶段,开始产生一些不随意运动,进而有随意运动,即学会的运动。

- A、 1~12个月
- B、 13~24个月
- C、 25~30个月
- D、 31~36个月

1050、婴幼儿气质特征是儿童个性发展的最原始的基础,其特点是( C)。

- A、 不受先天影响
- B、 跟后天无关
- C、 具有先天的性质、受后天环境、教育条件的影响
- D、 受先天影响

1051、婴幼儿的第一年是动作能力发展最迅速的时期。动作发展包括( C )两个方面。

- A、 上肢动作和下肢动作
- B、 躯干动作和四肢动作
- C、 粗大动作和精细动作
- D、 前庭平衡和大动作

1052、初生儿人称子宫外的胎儿,是因为其( A)器官仍有不健全的地方。

- A、 消化系统
- B、 呼吸系统
- C、 血液循环系统
- D、 泌尿系统

1053、产热营养素包括( C)。

- A、 碳水化合物、膳食纤维、水
- B、 无机盐微量元素、维生素
- C、 蛋白质、脂肪、碳水化合物
- D、 以上都是

1054、婴幼儿蛋白质缺乏很少导致( C )。

- A、 影响大脑发育

- B、 体重和身高增加缓慢
- C、 腹泻、酸中毒
- D、 肌肉松弛,抵抗力下降

1055、婴幼儿脂肪过量会导致(D )。

- A、 食欲减退
- B、 消化不良
- C、 发生酸中毒
- D、 以上都是

1056、钙的作用,下例(A )说法不正确。

- A、 参与血浆凝血因子的产生
- B、 构成骨骼、牙齿
- C、 镇静神经
- D、 参与血液凝固过程

1057、维生素的共同特点是( C)。

- A、 能在人体内合成
- B、 不存在于食物中
- C、 绝不能缺少
- D、 人体需要量很多

1058、膳食纤维来源于( B)。

- A、 动物性食物
- B、 植物性食物
- C、 水
- D、 以上都是

1059、水的主要来源为(D )。

- A、 摄入液体
- B、 固体食物中的水分
- C、 食物氧化及组织代谢所产生的水分
- D、 以上都是

1060、婴儿期添加食物应遵循下列原则:( B)。

- A、 由稀到稠,由少到多,由细到粗,由甜到咸
- B、 由稀到稠,由少到多,由细到粗,由一种到多种
- C、 由稀到稠,由少到多,由甜到咸,由一种到多种
- D、 由稀到稠,由甜到咸,由细到粗,由一种到多种

1061、儿童计划免疫是根据儿童的(C )制定的免疫程序。

- A、 免疫特点
- B、 传染病发生情况
- C、 免疫特点和传染病发生情况
- D、 以上都是

1062、预防接种后会出现轻重不同的反应,主要表现为打针部位会出现红、肿、痒、痛,称为( D)。

- A、 全身反应
- B、 过敏反应
- C、 高热反应
- D、 局部反应

1063、打针后( D)应避免剧烈活动。

- A、 一周内
- B、 4~5 天
- C、 3~4 天
- D、 2~3 天

1064、卡介苗可以预防( D)传染病。

- A、 肺炎
- B、 乙型肝炎
- C、 甲型肝炎
- D、 结核病

1065、部分母乳喂养或人工喂养婴幼儿则应正确选择配方奶( A)。

- A、 母乳化配方奶粉
- B、 全脂奶粉
- C、 儿童成长奶粉
- D、 羊奶粉

1066、不属于促进幼儿语言发育与大脑运动能力的发展的方法是( D)。

- A、 游戏
- B、 讲故事
- C、 唱歌
- D、 自行进食

1067、婴幼儿夏天要( A )洗澡。

- A、 天天
- B、 隔天
- C、 2-3 天
- D、 3-4 天

1068、婴幼儿因长为尿布包裹,易出现尿布疹,宜在大便后用清水清洗后用柔软的毛巾吸干,再涂一层( B)。

- A、 爽身粉
- B、 护臀霜或润肤油
- C、 bb 霜
- D、 湿疹膏

1069、婴幼儿衣服宜柔软、宽大,内衣用( C )。

- A、 毛线制品
- B、 尼龙制品
- C、 纯棉布制品
- D、 涤棉制品

1070、不准在地线和零线上装设开关和保险丝。禁止将接地线接到( D)。

- A、 自来水管
- B、 煤气管
- C、 暖气管
- D、 以上都是

1071、生活中关于用电安全说法正确的是:( C)。

- A、 凡是金属制品都是导电的
- B、 水是不导电的
- C、 湿手不可以接插头
- D、 可用湿布擦拭电器

1072、人体正常的情况下,从血液中把一些有害的物质解毒、排泄出去,是靠人体的( D )进行的。

- A、 肝脏
- B、 泌尿系统
- C、 肾脏
- D、 以上都是

1073、亲手为宝宝制作食品,尽可能选用新鲜的富含( B)的食物。

- A、 无机物质
- B、 有机物质
- C、 矿物质
- D、 维生素

1074、婴幼儿吃油炸食物易导致:( DD)。

- A、 不易消化
- B、 营养素损失较多

- C、 影响婴幼儿的健康
- D、 以上都是

1075、烧开的自来水冷却到(A ),此时水的生物活性增加,最适合人的生理需要。

- A、 35~45℃
- B、 25~35℃
- C、 15~25℃
- D、 5~15℃

1076、甜食、冷饮中维生素、矿物质含量低,会加剧营养(C)的状况,引起儿童虚胖。

- A、 过剩
- B、 不良
- C、 不平衡
- D、 缺乏

1077、有调查显示,易拉罐装饮料比瓶装饮料铝的含量高出(B)倍。

- A、 5~6
- B、 4~5
- C、 3~6
- D、 2~5

1078、矿泉水与自来水主要区别在于其中某种(A)的含量高,对特定人群有保健作用。

- A、 矿物质或微量元素
- B、 碳水化合物
- C、 膳食纤维
- D、 蛋白质或脂肪

1079、长期进食精细食物,不仅会因减少B族维生素的摄入而影响神经系统发育,还有可能因为铬元素缺乏“株连”(C)。

- A、 味觉
- B、 嗅觉
- C、 视力
- D、 听力

1080、儿童经常食用膨化食品,会影响正常饮食,导致多种营养素得不到保障和供给,易出现(C)。

- A、 蛋白质缺乏
- B、 维生素缺乏
- C、 营养不良
- D、 肥胖

1081、看食品的色泽,不要被所(B)食品迷惑。

- A、 外包装漂亮的
- B、 外观过于鲜艳、好看的
- C、 造型漂亮的
- D、 香味异常的

1082、世界卫生组织关于安全制备食品的须知:(B )。

- A、 加热熟食品
- B、 避免生食与熟食接触
- C、 保持厨房清洁
- D、 使用符合营养要求的饮用水

1083、逃生时,尽量采取保护措施,如用(D )。

- A、 湿毛巾捂住口鼻
- B、 湿衣物包裹身体
- C、 弯腰低头迅速撤离
- D、 以上都是

1084、取得劳动报酬\休息、休假,获得劳动、安全、卫生保护,接受职业培训技能是(A )的内容。

- A、 劳动权利
- B、 劳动义务
- C、 劳动争议
- D、 劳动就业

1085、发展生产,节制生育、广开就业门路,拓宽就业渠道、办好劳动就业服务企业,扩大就业安置是(D )的内容。

- A、 劳动权利
- B、 劳动义务
- C、 劳动争议
- D、 劳动就业途径

1086、( D)是确立劳动关系和法律关系的形式。

- A、 劳动权利
- B、 劳动义务
- C、 劳动就业
- D、 劳动合同

1087、未成年工的特殊保护是指根据未成年工的(C )的特点,对未成年工在劳动过程中特殊权益的保护。

- A、 年龄
- B、 性格
- C、 生理心理及身体尚未定型

D、 发育

1088、用人单位依照《劳动法》有关规定应当向劳动者支付经济补偿的,在( C)支付。

- A、 工作交接前
- B、 工作交接时
- C、 办理工作交接时
- D、 工作交接一半时

1089、妇女对依照法律规定的夫妻共同财产享有与其配偶平等的占有、使用、收益和处分的权利,不受双方( D)的影响。

- A、 约定
- B、 是否生育
- C、 对家庭贡献
- D、 收入状况

1090、对孕育健康后代以及严重遗传性疾病和碘缺乏病等地方病的发病原因、治疗和预防方法提供医学意见。是( A)的内容。

- A、 母婴保健指导
- B、 孕妇、产妇保健
- C、 胎儿保健
- D、 新生儿保健

1091、《母婴保健法》第三十六条规定:未取得国家颁发的有关合格证书,施行终止妊娠手术或者采取方法终止妊娠,致人死亡、残疾、丧失或者基本丧失劳动能力的,依照刑法第一百三十三条规定,追究( D)。

- A、 医疗责任
- B、 经济责任
- C、 民事责任
- D、 刑事责任

1092、经未成年人监护人的( B ),允许他人使用未成年人的肖像,未成年人有权取得适当的报酬。

- A、 口头承诺
- B、 书面同意
- C、 口头应允
- D、 协商同意

1093、我国《未成年人保护法》在規定对未成年人进行( D)的同时,还规定学校应对未成年人进行社会生活指导和青春期教育。

- A、 学校教育
- B、 学业教育
- C、 基本课程教育
- D、 德育、智育、体育、美育、劳动教育

1094、劳动权利是指有劳动能力的公民享有要求劳动就业的机会和( D)的权利。

- A、 获取工资
- B、 获得报酬
- C、 获得回报
- D、 按劳取酬

1095、专供婴幼儿的主、辅食品必须符合(D )卫生行政部门制定的营养、卫生标准和管理办法的规定。

- A、 县级
- B、 市级
- C、 省级
- D、 国务院

1096、目前我国允许使用并制定有(A )的仪器添加剂有防腐剂、抗氧化剂、发色剂、漂白剂、酸味剂、凝固剂、疏松剂、增稠剂、消泡剂、着色剂、乳化剂、品质改良剂、抗结剂、香料、营养强化剂、酶制剂、鲜味剂等 20 多类。

- A、 国家标准
- B、 化工标准
- C、 卫生标准
- D、 地方标准

1097、国家实行( B)、初等教育、中等教育、高等教育的学校教育制度。

- A、 幼儿教育
- B、 学前教育
- C、 小学教育
- D、 义务教育

1098、一般满从( C), 婴儿需添加辅食。

- A、 12 个月
- B、 8 个月
- C、 6 个月
- D、 3 个月

1099、合理安排婴幼儿的饮食, 能保证婴幼儿获得充足的营养, 能促进婴幼儿的( A)。

- A、 生长发育
- B、 身高的增长
- C、 体重的增加
- D、 新陈代谢

1100、(C)左右帮助孩子学习自己吃饭,逐渐过渡到让孩子自己拿着小勺舀着吃。

- A、 8 个月
- B、 10 个月
- C、 1 岁
- D、 2 岁

1101、在睡眠过程中氧和能量的消耗最少,有利于(B)。

- A、 恢复体力
- B、 消除疲劳
- C、 新陈代谢
- D、 消化吸收

1102、培养婴幼儿有规律地大小便,可以在大脑建立起一系列的条件反射,提高机体的工作效率,以保证各器官良好的(D)。

- A、 工作
- B、 休息
- C、 运转
- D、 以上都是

1103、(D)个月的婴儿可以让他自己抱奶瓶喝奶。

- A、 3~4
- B、 4~5
- C、 5~6
- D、 6~8

1104、学习使用餐具是一个循序渐进的过程,(D)。

- A、 一定要有耐性
- B、 不要随便责怪婴幼儿
- C、 应给予必要的鼓励
- D、 以上都是

1105、体重的测量以为单位,准确记录至小数点后2位(D)。

- A、 磅
- B、 斤
- C、 克
- D、 千克

1106、胸围的测量应于平静呼吸时读数,记录至(D)。

- A、 0.5cm
- B、 0.3cm
- C、 0.2cm
- D、 0.1cm

1107、不属于皮肤功能的是:(A )。

- A、 消化吸收
- B、 调节体温
- C、 感受刺激
- D、 屏障刺激

1108、婴幼儿发热时,( A)。

- A、 包裹不要太紧
- B、 衣服穿厚些
- C、 身体发烫时,衣服穿多点
- D、 手脚凉时可少穿一层

1109、发生呕吐的原因:( D)。

- A、 喂养不当
- B、 消化不良、消化道疾病
- C、 脑部疾病
- D、 以上都是

1110、注意观察孩子的面色、精神状态、如果伴随有剧烈的腹痛、( D)等症状应去医院看医生。

- A、 腹泻
- B、 呕吐
- C、 发烧
- D、 以上都是

1111、疾病因素引起便秘原因:( C)。

- A、 佝偻病引起腹肌张力增强
- B、 营养不良使肠蠕动亢进
- C、 肛裂或肛门周围炎症导致排便疼痛
- D、 腹腔肿瘤压迫肠腔让排便顺畅

1112、鹅口疮严重者可蔓延到悬雍垂、扁桃体等,常表现为( D)。

- A、 口腔黏膜较湿,多有流涎
- B、 口腔黏膜较湿,少有流涎
- C、 口腔黏膜较干,多有流涎
- D、 口腔黏膜较干,少有流涎

1113、鹅口疮常见临床表现(A )。

- A、 口腔粘膜附着白色凝乳状物
- B、 皮肤可出现红色斑丘疹
- C、 多见于学龄期婴儿
- D、 持续高热 3-4 天以上

1114、患鹅口疮婴儿拒绝吸奶时可用( A)喂。

- A、 小勺
- B、 杯子
- C、 小碗
- D、 奶瓶

1115、早产儿的生理性黄疸会( D)。

- A、 出现得较迟
- B、 症状较重
- C、 持续较久
- D、 以上都是

1116、符合下列情况之一的要考虑为病理性黄疸:( D)。

- A、 黄疸进行性加重
- B、 黄疸较深,连同足底、手心的皮肤也发黄
- C、 皮肤呈黄绿色,伴大便色泽变淡或呈灰白色如油灰状,同时小便深黄
- D、 以上都是

1117、仔细观察黄疸变化,若黄疸加深,应及时到医院就诊,以免发生( B)。

- A、 新生儿缺氧缺血性脑病
- B、 胆红素脑病
- C、 母乳性黄疸
- D、 生理性黄疸

1118、宝宝的脐带脱落前或刚脱落脐窝还没干燥时,一定要保证脐带和脐窝的( B)。

- A、 干净
- B、 干燥
- C、 不被感染
- D、 不被浸湿

1119、如果(D ),那很可能是肚脐出现了感染。

- A、 肚脐的渗出液像脓液或有恶臭味

- B、 肚脐和周围皮肤变得很红
- C、 用手摸起来感觉皮肤发热
- D、 以上都是

1120、 尿布疹多见于(B )以内的婴儿。

- A、 1 岁
- B、 6 个月
- C、 3 个月
- D、 1 个月

1121、 尿布疹护理方法:(D )。

- A、 选择适宜的尿布
- B、 换下尿布后不必马上包上尿布
- C、 让小屁股通风一会保持干燥
- D、 以上都是

1122、 尽可能把药物放在婴幼儿( D )的地方。

- A、 玩具 B、 餐具 C、 食物 D、 以上都是

1123、 不要把( C )等东西放在桌子上没人照管。

- A、 杯子
- B、 瓶子
- C、 电热锅
- D、 脸盆

1124、 在浴室使用( D )。

- A、 防滑垫
- B、 防滑地板
- C、 安全抓手
- D、 以上都是

1125、 不要随处放置(D )。

- A、 打火机
- B、 火柴
- C、 蜡烛
- D、 以上都是

1126、 教育幼儿游戏中不可随意藏入( C )的地方。

- A、 有人照顾
- B、 有人能及
- C、 无人照顾
- D、 有人关注

1127、黄灯亮时, ( D )。

- A、 不准车辆、行人通行
- B、 已越过停止线的车辆,可以继续通行
- C、 已进入人行横道的行人,可以继续通行
- D、 以上都是

1128、乘车时不要把(D )伸出手窗外,以免被对面来车或路边树木等刮伤。

- A、 头
- B、 手
- C、 胳膊
- D、 以上都是

1129、异物进入气管后,引起呛咳,成人常会错误地(B ),这样很易使异物进入气管的深部。

- A、 倒立拍背
- B、 直接给婴儿拍背
- C、 趴卧拍背
- D、 腹部推压

1130、宠物咬伤伤口的正确处理方法是(D ),以清除或杀灭污染伤口的狂犬病毒。

- A、 将伤口挤压出血
- B、 用浓肥皂水反复冲洗伤口,再用大量清水冲洗
- C、 擦干后用 5%碘酒烧灼伤口
- D、 以上都是

1131、婴幼儿的主被动操横托抱动作要领是左手托在婴幼儿的(C ),再用右手托住婴儿的臀部。

- A、 头部
- B、 颈部
- C、 颈背部
- D、 肩部

1132、婴幼儿的主被动操横托抱,可以让( A)的自如控制力提前出现。

- A、 头部
- B、 腰背
- C、 下肢
- D、 上肢

1133、在进行婴幼儿的主被动操横托抱时,在( C)操作,距离床的位置要近一些。

- A、 稍高的位置
- B、 稍低的位置
- C、 可控制的范围内
- D、 不可控制的范围内

1134、在进行婴幼儿的主被动操提腿运动时,婴儿俯卧,成人双手握住婴儿( B)。

- A、 两脚踝
- B、 两小腿
- C、 两膝盖
- D、 两大腿

1135、在进行婴幼儿的主被动操跳跃运动时,把婴儿托起( B)桌(床)面(让婴儿足尖着地)轻轻跳跃。

- A、 站在
- B、 离开
- C、 接近
- D、 躺在

1136、为婴幼儿选择发展听说能力的图片,图片不提倡卡通图,以便婴幼儿( C),并能与实际的物品配 对。

- A、 容易混淆
- B、 不易混淆
- C、 容易辨认
- D、 不易辨认

1137、( B )的婴幼儿看电视会造成视听疲劳和右脑表象储存困难,影响再造想象的形成,从而影响大脑 的发育。

- A、 1 岁以前
- B、 2 岁以前
- C、 3 岁以前
- D、 4 岁以前

1138、婴幼儿在认知游戏活动中,可以促进( C)能力的发展。

- A、 手
- B、 脚
- C、 手眼协调
- D、 语言

1139、婴幼儿的认知游戏相同的内容需要( D )。

- A、 一次搞定

- B、 不需重复
- C、 偶尔复习
- D、 反复进行

1140、棉质尿布用后应随换随洗,可选用( B )洗,用清水漂洗干净,再放在阳光下晒干。

- A、 碱性肥皂
- B、 中性肥皂
- C、 药性肥皂
- D、 洗衣粉

1141、婴幼儿的皮肤细嫩,容易损伤,衣着不应选择( B )。

- A、 简单、宽松、质地柔软
- B、 以涤棉质衣料为主
- C、 吸湿性、吸水性和透气性良好
- D、 易穿脱且不影响四肢活动

1142、育婴员是通过对 0~3 岁婴幼儿的( D )的服务,辅助和指导家长完成科学育儿工作的人员。

- A、 生活照料
- B、 护理
- C、 教育
- D、 生活照料、护理和教育

1143、职业道德具有( D )的规范性。

- A、 操作
- B、 服务
- C、 态度
- D、 纪律

1144、社会主义职业道德是以协调个人、集体和个人关系为核心的,离开( C ),这三者之间的矛盾是无法协调的。

- A、 个人
- B、 集体和个人
- C、 集体主义
- D、 集体

1145、职业道德的内容表现为某一职业所形成的特有的( B )和习惯。

- A、 职业表现、职业特征、职业特色
- B、 职业心理、职业品质、职业传统
- C、 职业心理、职业表现、职业特征
- D、 职业品质、职业传统、职业特征

1146、0~3 岁婴幼儿是对周围的人建立信任感的关键期,是一种( C )情绪交往活动。

- A、 间接的 B、
- 可控的 C、
- 直接的 D、
- 不可控的

1147、在个体发展过程中,会因为成熟出现( B )。

- A、 生长速度加快
- B、 旧特征消失的现象
- C、 生长速度减慢
- D、 生长停滞现象

1148、婴幼儿机体柔嫩,生理调节和适应能力不成熟,平均每天睡眠长达 20 小时。由窒息、溶血、感染等导致的死亡率高,是( A )的特点。

- A、 新生儿期
- B、 婴儿期 C、
- 幼儿期 D、
- 学龄前期

1149、生长发育在一定范围内受先天和后天因素的影响而存在差异。因此婴幼儿生长发育是否正常应考虑( A )对个体的影响。

- A、 各种因素
- B、 先天因素
- C、 后天因素
- D、 环境因素

1150、年龄阶段性是指在婴幼儿心理发展的全过程中,表现出一些在( C )不同的年龄阶段特点。

- A、 形式上
- B、 数量上
- C、 质量上
- D、 内容上

1151、婴幼儿从 6 个月到 3 周岁左右,手在视野范围内完成操纵、摆弄物品的活动,都是各种( A )飞快发展的时期。

- A、 感知觉能力
- B、 动手能力 C、
- 认知能力 D、
- 视觉能力

1152、1 岁以后的婴幼儿记忆过程缺乏( C )。

- A、 想象力
- B、 主动性
- C、 明确的目的
- D、 创造性

1153、( B )阶段主要产生的是人类的低级思维形式,即感知动作思维,又称直觉行动思维。

- A、 0~1 岁
- B、 1~3 岁
- C、 2~3 岁
- D、 3~4 岁

1154、3 岁以前的婴幼儿想象的内容也比较简单,一般是他所看到成人或其他大孩子的某个简单行为的重复,属于( B )的范围,缺乏创造性。

- A、 再认
- B、 再造想象
- C、 创造想象
- D、 回忆

1155、7-10 岁儿童能集中注意( D )。

- A、 5 分钟
- B、 10 分钟
- C、 15 分钟
- D、 20 分钟

1156、婴幼儿 1 岁左右,在活动过程中,通过( C )逐步认识作为生物实体的自我。

- A、 自我评价
- B、 自我监督
- C、 自我感觉
- D、 自我欣赏

1157、人类在进化过程中所获得的基本情绪大约有 8~10 种。它们是( C )。

- A、 同时出现的
- B、 先后出现的
- C、 逐步出现的
- D、 同步出现的

1158、婴幼儿自己用言语来调节自己的行为,“我要”干什么,“我不要”干什么,这种具有独立性的行为开始出现一般是在( C )阶段发生的。

- A、 0~1 岁
- B、 1~2 岁
- C、 2~3 岁

D、 3~4 岁

1159、婴幼儿早期已经表现出来的个人特点,就是气质。比如( B )。

- A、 对人的面孔的喜爱
- B、 睡眠规律、活动水平、是否爱哭、哭声大小
- C、 喜欢让人抱
- D、 手舞足蹈

1160、婴幼儿言语发展的前语言阶段指的是( A )。

- A、 0~1 岁
- B、 0~2 岁
- C、 0~3 岁
- D、 3~4 岁

1161、最初的动作常常是全身的、笼统的、弥漫性的,以后才逐渐形成局部的、准确的、专门化的动作,是动作发展( B )的规律。

- A、 从上部动作到下部动作
- B、 从整体动作到分化动作
- C、 从粗大动作到精细动作
- D、 从大肌肉动作到小肌肉动作

1162、婴儿在出生 5~6 月之后到第二年末,大脑仍在急剧的发展,并奠定一个重要的基础,需要( B )的支持。

- A、 蛋白质
- B、 营养素
- C、 脂肪
- D、 碳水化合物

1163、婴幼儿每日营养素的需要量与成人不同,婴幼儿( A )。

- A、 年龄愈小需要量相对愈高
- B、 年龄愈大需要量相对愈高
- C、 年龄愈小需要量相对愈低
- D、 年龄愈大需要量相对愈低

1164、婴幼儿所必需的营养素包括( A )。

- A、 7 种
- B、 6 种
- C、 5 种
- D、 3 种

1165、优质蛋白质包括( D )。

- A、 奶类、豆类
- B、 蛋类
- C、 肉类
- D、 以上都是

1166、婴幼儿脂肪的作用( D )。

- A、 防止体热的消散 B、  
保护脏器不受损伤
- C、 有利于脂溶性维生素的吸收
- D、 以上都是

1167、碳水化合物能节省( B )的消耗量和协助脂肪氧化。

- A、 脂肪 B、  
蛋白质
- C、 碳水化合物
- D、 无机盐和微量元素

1168、维生素 D 缺乏可导致( D )。

- A、 坏血病
- B、 癞皮病
- C、 干眼病
- D、 佝偻病

1169、膳食纤维主要有以下功能:( D )。

- A、 预防胆结石、影响血糖水平
- B、 预防结肠癌、助排便
- C、 防止能量过剩及肥胖
- D、 以上都是

1170、若婴幼儿摄水量超过正常需要量,而心、肾、内分泌功能不全时,能发生( A )。

- A、 水中毒
- B、 水肿 C、  
脱水 D、  
脑水肿

1171、母乳含有婴儿所需的各种免疫物质,可预防各种( A )疾病。

- A、 感染性与传染性
- B、 营养性
- C、 神经性
- D、 免疫性

1172、儿童计划免疫有针对性地将生物制品接种到人体中,提高( B )的特异免疫力。

- A、 患病者
- B、 易感者
- C、 儿童
- D、 成人

1173、计划免疫分为主动免疫和被动免疫,( A )。

- A、 主动免疫免疫效果维持时间长,被动免疫抗病力维持时间则短
- B、 主动免疫免疫效果维持时间长,被动免疫抗病力维持时间也长
- C、 主动免疫免疫效果维持时间短,被动免疫抗病力维持时间也短
- D、 主动免疫免疫效果维持时间短,被动免疫抗病力维持时间则长

1174、婴幼儿发热时不要接种( A )三联疫苗。

- A、 白喉、百日咳、破伤风
- B、 乙肝
- C、 麻风腮
- D、 肺炎

1175、婴幼儿易患消化紊乱、腹泻、营养不良等疾病。因此,应提倡纯母乳喂养至少( C )个月。

- A、 3
- B、 4
- C、 6
- D、 12

1176、幼儿每( B )月应进行一次体格检查。

- A、 1~3
- B、 3~6
- C、 6~12
- D、 9~12

1177、婴幼儿洗澡水温应保持( D )。

- A、 30~32℃
- B、 33~35℃
- C、 35~36℃
- D、 37~40℃

1178、尿布应选择( D )。

- A、 吸湿性强
- B、 透气性好
- C、 柔软

D、 以上都是

1179、新生儿头部已形成的乳痂,可用煮熟后晾凉的( B )涂抹浸润 24 小时,再用棉棒轻轻擦拭。

- A、 食用动物油
- B、 食用植物油
- C、 肥皂水
- D、 水

1180、忌用樟脑球收藏衣服和物品,以防可能引起的婴幼儿( A )。

- A、 急性溶血性贫血
- B、 溶血症
- C、 败血症
- D、 破伤风

1181、购买家用电器后要认真阅读产品说明书,注意使用( B )。

- A、 方法
- B、 电压和功率
- C、 标准
- D、 期限

1182、家用电器的电源线绝缘破损时,要用( B )包扎好。

- A、 创可贴
- B、 绝缘胶布
- C、 伤湿止痛膏
- D、 药用胶带

1183、如果发现有人触电,应( D ),使触电者马上脱离电源。

- A、 赶快切断电源
- B、 用干燥的木棍将电线挑开
- C、 用竹竿将电线挑开
- D、 以上都是

1184、不要在电线上( D ),以防绝缘破损漏电造成触电。

- A、 放风筝
- B、 晒衣服
- C、 装设天线
- D、 以上都是

1185、食品安全指食品( A )。

- A、 无毒、无害
- B、 无添加剂
- C、 符合一般营养要求
- D、 经过转基因处理

1186、由于儿童发育还不完善,对有害物质的耐受性( B )。

- A、 较低
- B、 特别低
- C、 较高
- D、 特别高

1187、亲手为宝宝制作食品,( A )较有保障。

- A、 安全性
- B、 质量
- C、 营养性
- D、 卫生

1188、罐头食品中往往含有( D ),经常食用对人体有害。

- A、 调味品
- B、 甜味剂
- C、 防腐剂
- D、 以上都是

1189、饮白开水不光能满足儿童对水的生理需要,还能为他们提供一部分( A )。

- A、 矿物质和微量元素
- B、 蛋白质
- C、 脂肪
- D、 碳水化合物

1190、如果一味沉溺于甜味之中,儿童的味觉将发育不良,无法感受天然食物的清淡滋味,甚至影响到( A )的发育。

- A、 大脑
- B、 呼吸系统
- C、 消化系统
- D、 体格

1191、铝过多可能导致儿童( D )。

- A、 智力下降
- B、 行为异常
- C、 不利于儿童骨骼及牙齿发育

D、 以上都是

1192、( D )等,多数产品在除去水中工业污染物时,也将水中的矿物质和微量元素去除一大部分。长期饮用,必然使人体某些矿物质或微量元素摄入不足。

- A、 蒸馏水
- B、 纯净水
- C、 太空水
- D、 以上都是

1193、铬含量不足会使( D )。

- A、 胰岛素的活性减退
- B、 调节血糖的能力下降
- C、 造成近视
- D、 以上都是

1194、膨化食品中普遍高盐、高味精,将使孩子成年后易导致( A )。

- A、 高血压和心血管病
- B、 高血脂
- C、 高胆固醇
- D、 糖尿病

1195、儿童如果饮用了过多的咖啡因则会出现( D )等症状。

- A、 头疼、头晕、烦躁
- B、 心律加快
- C、 呼吸急促
- D、 以上都是

1196、补品中含有激素和微量活性物质,对儿童正常的( B )有影响。

- A、 身高发育
- B、 生长发育
- C、 生理代谢
- D、 生理发育

1197、大量研究资料显示,不科学的饮食作为一个致病因素,对儿童健康的影响并不比( D )小。

- A、 细菌
- B、 病毒
- C、 病原微生物
- D、 以上都是

1198、五颜六色汽水除含一定的( A )外,几乎没有什么营养。

- A、 热量
- B、 蛋白质
- C、 脂肪
- D、 微量元素

1199、注意看食品包装标识是否齐全,注意食品外包装是否标明( D )。

- A、 厂名
- B、 厂址
- C、 生产日期
- D、 以上都是

1200、食品出锅后应立即吃掉,夏秋季节在室温下存放不应超过( C )。

- A、 1 小时
- B、 2 小时
- C、 4 小时
- D、 6 小时

1201、婴幼儿安全防火基本要求( A )。

- A、 不得玩火
- B、 不得用火柴
- C、 不得点火
- D、 不得燃放鞭炮

1202、纸张、木头或布起火时,可用( B )来扑救。

- A、 土
- B、 水
- C、 沙泥
- D、 干粉灭火器

1203、火警电话的号码是( B )。

- A、 110
- B、 119
- C、 120
- D、 122

1204、着火时身处楼房的,要注意( D )。

- A、 不要盲目乱跑
- B、 不要跳楼逃生
- C、 可以躲到居室里或者阳台上
- D、 以上都是

1205、劳动者义务包括( A )等内容。

- A、 履行劳动合同,提高职业技能、执行劳动安全卫生规程
- B、 平等就业和选择职业、取得劳动报酬、休息、休假 C、 获得劳动、安全、卫生保护
- D、 接受职业培训技能、享受社会保险和福利

1206、劳动就业是指具有劳动能力的公民在( B )从事某种有一定劳动报酬或经营收入的社会职业。

- A、 任何年龄内
- B、 法定劳动年龄内
- C、 特定年龄内
- D、 所有年龄内

1207、( C )是指劳动者与用人单位之间为确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议。

- A、 劳动权利
- B、 劳动义务
- C、 劳动合同
- D、 劳动就业

1208、未成年工的特殊保护是指根据未成年工的身体尚未定型的特点,对未成年工在劳动过程中( D )的保护。

- A、 人生安全
- B、 经济收入
- C、 休息时间
- D、 特殊权益

1209、工资是指基于劳动关系,用人单位根据劳动者提供的( A ),按照合同约定支付的货币报酬。

- A、 劳动数量和质量
- B、 劳动时间
- C、 计件数量
- D、 劳动数量

1210、用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定( C )。

- A、 时间
- B、 报酬
- C、 服务期
- D、 工种

1211、劳动者在解除或者终止劳动合同时应当按照双方约定,办理( A )。

- A、 工作交接
- B、 移交手续
- C、 交接手续
- D、 解除手续

1212、《母婴保健法》第七条规定：“保健和医疗机构应当为公民提供婚前( C )”。

- A、 疾病治疗
- B、 生育状况检查
- C、 保健服务
- D、 婚前心理指导

1213、为胎儿生长发育进行定期监护,建立季、月、周联系卡,并及时提供咨询和医疗指导,是( C )的内容。

- A、 母婴保健指导
- B、 孕妇、产妇保健
- C、 胎儿保健
- D、 新生儿保健

1214、《母婴保健法》第三十一条规定:医疗保健机构按照( D )卫生服务部门的规定,负责其职责范围内的母婴保健工作,建立医疗保健工作规范,提高医疗技术水平,采取各种措施方便群众,做好母婴保健服务工作。

- A、 县
- B、 市
- C、 省
- D、 国务院

1215、关于未成年人隐私权说法错误的是( D )。

- A、 隐私权是未成年人享有的权利
- B、 个人信息不被别人知晓
- C、 禁止他人非法干涉
- D、 个人行为不被公众知晓

1216、未成年人依法享有的、能够无偿取得死亡公民遗留的个人合法财产的权利,是未成年人享有的( D )。

- A、 财产所有权
- B、 受赠权
- C、 知识产权
- D、 继承权

1217、我国( A )在规定对未成年人进行德育、智育、体育、美育、劳动教育的同时,还规定学校应对未成年人进行社会生活指导和青春期教育。

- A、 《未成年人保护法》
- B、 《母婴保健法》
- C、 《妇女权益保障法》
- D、 《劳动合同法》

1218、在我国, ( C ) 的未成年人, 如果完成了规定年限的义务教育, 不再继续升学的, 依法可以从事有经济收入的劳动或者个体劳动的权利。

- A、12~16 周岁
- B、16~17 周岁
- C、年满 16 周岁、未满 18 周岁
- D、17~18 周岁

1219、婴幼儿食品是指满足婴幼儿( B )所需的食品。

- A、断奶需要
- B、正常生长发育
- C、添加辅食
- D、满足主食

1220、储存、运输和装卸食品的容器包装、工具、设备和条件必须( B ), 保持清洁, 防止食品污染。

- A、密封
- B、安全、无害
- C、隔离
- D、防尘

1221、食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐和加工的需要而加入食品中的( C )或者天然物质。

- A、颜料
- B、发酵剂
- C、化学合成
- D、化学物质

1222、《中华人民共和国教育法》第二条指出: “在中华人民共和国境内的各级各类教育, 适用本法。” 所以( A )早期教育也适用本法。

- A、0~3 岁
- B、3~6 岁
- C、1~6 岁
- D、0~6 岁

1223、学制系统内的学校和其他教育机构的设置、教育形式、修业年限、招生对象、培养目标等, 由( D )或者由国务院授权教育行政部门规定。

- A、县级政府
- B、市级政府
- C、省级政府
- D、国务院

1224、新鲜西红柿中不含有( D )。

- A、维生素 B1                  B、维生素 B2                  C、维生素 A                  D、烟酸

1225、果汁是水果经过压榨而去掉残渣制作的,加工过程会使水果的( B )。

- A、水分丢失  
B、营养成分损失  
C、新鲜度降低  
D、口感被破坏

1226、( A )以下的儿童晚上 8 点左右睡觉最为适宜,如果入睡过晚,会影响到生长激素的分泌。

- A、3 岁  
B、6 岁  
C、8 岁  
D、10 岁

1227、要做好( D ),使婴幼儿生活规律,精神愉快。

- A、动静活动结合  
B、脑力与体力活动的结合  
C、室内和室外活动的结合  
D、以上都是

1228、培养良好饮食习惯的注意事项:( D )。

- A、进食的环境不太嘈杂,以免影响进食情绪  
B、进食最好一次性喂饱,一次时间不要过长,不要让其含着嘴儿玩  
C、进食的位置要固定,不边走路边进食  
D、以上都是

1229、睡眠过程中婴幼儿脑垂体分泌的生长激素比清醒状态时增加( C ),有利于婴幼儿的生长发育。

- A、1 倍  
B、2 倍  
C、3 倍  
D、4 倍

1230、餐前( C )不吃零食,以免影响婴幼儿的食量。 85

- A、10 分钟                  B、20 分钟                  C、30 分钟                  D、60 分钟

1231、辅助婴幼儿进餐应注意:( D )。

- A、 不要边吃边玩
- B、 不挑食
- C、 不剩饭菜
- D、 以上都是

1232、 婴幼儿在( C )自己拿勺吃饭较为熟练。

- A、 半岁
- B、 1岁
- C、 1岁半
- D、 2岁

1233、 筷子的使用较为困难,属于( D )。

- A、 认知能力
- B、 社会性行为
- C、 大动作能力
- D、 精细动作

1234、 婴幼儿睡前要求( D )。

- A、 排一次尿
- B、 避免过度兴奋
- C、 清洁口腔
- D、 以上都是

1235、 养成( D )排便的习惯。

- A、 每天早晨起床后
- B、 午睡起床后
- C、 临睡前
- D、 以上都是

1236、 大人要细心观察,掌握婴幼儿大小便的规律:( D )。

- A、 通常在什么时候大便
- B、 小便前会有什么表情
- C、 用“嘘”或“嗯”的声音建立条件反射
- D、 以上都是

1237、 婴幼儿( D )后要穿整裆裤。

- A、 半岁
- B、 1岁
- C、 1岁半
- D、 不穿纸尿裤或尿布时

1238、 身高受( D )的影响。

- A、 种族
- B、 遗传
- C、 环境
- D、 以上都是

1239、头围、胸围相等年龄大约是( A )。

- A、 1 岁
- B、 2 岁
- C、 3 岁
- D、 4 岁

1240、婴幼儿( C )比例大于正常时,应考虑内分泌疾病或软骨发育不全等疾病。

- A、 头部占身高
- B、 颈部占身高
- C、 坐高占身高
- D、 躯干占身高

1241、测卧式身长时让婴幼儿仰卧,双眼直视正上方,( D )贴紧测量板,双膝由测量人员压平。

- A、 头和肩胛骨
- B、 臀
- C、 双足跟
- D、 以上都是

1242、婴幼儿正常腋温( B ),正常肛温 36.5~37.7℃范围内。

- A、 35.8~36.8℃
- B、 36~37℃
- C、 36.2~37.2℃
- D、 36.4~37.4℃

1243、皮肤( D ),是细菌生长繁殖的温床,还能堵塞毛囊口,影响皮肤的排泄作用。

- A、 排出的皮脂、汗液
- B、 皮肤本身脱落的上皮细胞
- C、 周围环境中的尘土形成的污垢
- D、 以上都是

1244、由于脐部的解剖特点该处易出现细菌感染而发生( A ),因此新生儿脐部护理非常重要。

- A、 脐炎
- B、 脐疝

- C、 坏血症
- D、 溶血症

1245、发热时身体容易排出更多的水分,应多给孩子喂( B )。

- A、 热开水
- B、 温开水
- C、 含水量少的流质食物
- D、 含水量少的半流质食物

1246、物理擦浴退热过程应注意( D )。

- A、 不要受凉
- B、 保护好腹部
- C、 擦浴完毕要擦干皮肤
- D、 以上都是

1247、如果婴幼儿的体温超过  $39.4^{\circ}\text{C}$ ,可以采取用温水不间断地擦身体降温,并且每隔( D )量一次体温。

- A、 60 分钟
- B、 30 分钟
- C、 20 分钟
- D、 10 分钟

1248、患儿口腔黏膜可见白色斑点,以颊部黏膜多见,但( D )都可受累。

- A、 齿龈
- B、 舌面
- C、 上腭部
- D、 以上都是

1249、发生呕吐应观察的内容:( D )。

- A、 呕吐物的色、量和性质
- B、 呕吐的方式
- C、 婴幼儿的精神状态
- D、 以上都是

1250、如果喂奶后( B )以上仍出现呕吐,且呕出物酸臭伴有食欲减退、疲乏等,可能伴有内、外科疾病,应到医院就诊。

- A、 0.5 小时
- B、 1 小时
- C、 1.5 小时
- D、 2 小时

1251、先天性巨结肠表现为( C )。

- A、 较少便秘
- B、 不呕吐
- C、 情绪不好
- D、 偶尔哭

1252、在孩子腹痛但精神状态好,无其他伴随症状时,可( A )一下肚子。

- A、 顺时针按摩
- B、 逆时针按摩
- C、 热水袋等热敷
- D、 冷水袋等冷敷

1253、识别脱水要点:( D )。

- A、 眼周围出现皱纹
- B、 眼睛有塌陷的感觉
- C、 眼泪少
- D、 以上都是

1254、做好婴幼儿臀部的护理,洗后可涂些( C )药膏,以防红臀。

- A、 抗生素类
- B、 激素类
- C、 油脂类
- D、 凝胶类

1255、除了大便次数,( D )等,都可判别是否便秘。

- A、 大便质地的软硬
- B、 排便时用力程度
- C、 排便时疼痛与否
- D、 以上都是

1256、服用药物引起便秘原因:( D )。

- A、 肠道内益生菌增加
- B、 肠内环境变化,肠蠕动正常
- C、 pH 值下降
- D、 肠功能紊乱

1257、( A )以上的婴儿就可以训练定时排便。

- A、 3 个月
- B、 6 个月
- C、 8 个月
- D、 12 个月

1258、婴儿嘴里长白膜多见于( A ),是白色念珠菌感染所致。

- A、 鹅口疮
- B、 地图舌
- C、 手足口病
- D、 疱疹性咽炎

1259、患鹅口疮应将婴儿的食具如奶瓶、奶嘴、小勺、口杯等进行( B )处理。

- A、 灭菌
- B、 消毒
- C、 清洁
- D、 清洗

1260、生理性黄疸孩子没有什么不适,第4~5天最黄,在第( C )消退。

- A、 2~3 星期
- B、 2 星期
- C、 1~2 星期
- D、 1 星期

1261、符合下列情况之一的要考虑为病理性黄疸:( D )。

- A、 黄疸较深,连同足底、手心的皮肤也发黄
- B、 皮肤呈黄绿色,伴大便色泽变淡或呈灰白色如油灰状,同时小便深黄
- C、 生理性黄疸消退后,又重新出现皮肤黄染
- D、 以上都是

1262、观察宝宝日常生活,只要宝宝出现( D )状况,就要及时去医院检查。

- A、 皮肤看起来愈来愈黄
- B、 精神疲乏及食欲差
- C、 嗜睡,容易尖声哭闹
- D、 以上都是

1263、如果覆盖的纱布湿了或伴有渗液、渗血时,必须重新扎紧,用棉球,轻轻地从脐带根部向周围的皮肤擦洗( C )。

- A、 双氧水
- B、 碘伏
- C、 75%的酒精
- D、 95%的酒精

1264、脐带一旦被水或被尿液浸湿,要马上应用干棉球或干净柔软的纱布擦干,然后用( C )消毒。

- A、 碘酊棉球
- B、 碘伏棉球

- C、 75%酒精棉签
- D、 95%酒精棉签

1265、用 75%酒精浸湿的棉签,以从脐带根部到脐带再到周围皮肤的先后顺序( A )擦拭。

- A、 从内到外
- B、 从外到内
- C、 来回
- D、 上下

1266、由于脐带脱落的表面还没有完全长好,肉芽组织里的液体渗出所致,用 75%的酒精轻轻擦干净即可,一般 1 天 1~2 次即可,( C )后脐窝就会干燥。

- A、 6~7 天
- B、 4~5 天
- C、 2~3 天
- D、 1~2 天

1267、尿布疹的原因有:( D )。

- A、 粪便引起
- B、 霉菌引起
- C、 细菌引起
- D、 以上都是

1268、适宜的尿布包括:( D )。

- A、 合格的一次性尿布
- B、 柔软的棉布
- C、 吸水性强的纱布
- D、 以上都是

1269、得了湿疹的孩子会感到患处刺痒,因而会( D )。

- A、 焦躁不安
- B、 哭闹不止
- C、 影响睡眠
- D、 以上都是

1270、湿疹的护理的要点:根据医生要求进行涂药( D )。

- A、 不用刺激性止痒药
- B、 保持皮肤清洁
- C、 避免感染
- D、 以上都是

1271、保持好药品和化学品容器上原有的( B )。

- A、 刻度
- B、 标签
- C、 有效期
- D、 说明书

1272、用( D )暖气片或暖气管,以免婴幼儿烫伤。

- A、 毛巾盖好 B、
- 家具挡住 C、
- 防护栏隔离 D、
- 以上都行

1273、电(热)加热器应安在婴幼儿( B )的墙上。

- A、 看不到
- B、 够不到
- C、 摸不到
- D、 拿不到

1274、把婴幼儿放在水里前,一定要先用( D )试好温度。

- A、 手肘
- B、 手腕
- C、 手背
- D、 以上都是

1275、不把( D )放在婴幼儿能够到的地方。

- A、 洗涤剂
- B、 含酒饮料
- C、 碘伏
- D、 以上的是

1276、家具一定要( B ),以防孩子把家具弄翻。

- A、 结实
- B、 固定好
- C、 靠墙
- D、 以上都是

1277、训练婴幼儿精细动作(抓捏黄豆、花生等小物品)时,每次只能放下( A ),成人应严格看护。

- A、 一粒

- B、 二粒
- C、 三粒
- D、 四粒

1278、玩绳子时,教育幼儿不可将绳子套住( A )。

- A、 脖子
- B、 腰部
- C、 手腕
- D、 脚踝

1279、结伴外出时,不要相互( D )。

- A、 追逐
- B、 打闹
- C、 嬉戏
- D、 以上都是

1280、穿越马路要听从交通民警的指挥,要遵守交通规则,做到( A )。

- A、 “绿灯行,红灯停”
- B、 “黄灯行,红灯停”
- C、 “绿灯停,红灯行”
- D、 “黄灯停,红灯行”

1281、交通信号灯规则:( C )。

- A、 红灯亮时车辆、行人通行
- B、 绿色箭头灯亮时不准许车辆按箭头所示方向通行
- C、 黄灯闪烁时车辆、行人在确保安全的原则下可以通行
- D、 黄灯闪烁时车辆、行人必须停止通行

1282、口对口急救步骤:先将婴幼儿的头部略向后倾( B )左右,以使其呼吸道畅通,检查喉内有无异物。

- A、 10°
- B、 15°
- C、 20°
- D、 25°

1283、呼吸道异物,如处理不当或处理不及时,能造成婴儿( A )。

- A、 窒息死亡
- B、 肺炎
- C、 气管炎
- D、 呛咳

1284、被宠物咬伤后,可注射( D )。

- A、 狂犬病血清
- B、 破伤风抗毒素
- C、 狂犬疫苗
- D、 以上都是

1285、婴幼儿的主被动操做时少穿些衣服,注意( D )。

- A、 动作要到位
- B、 速度要快些
- C、 不要进行眼神对视
- D、 不要操之过急,要循序渐进

1286、婴幼儿的被动操扩胸运动注意事项:两臂分开时( C ),胸前交叉时放松。

- A、 不要用力
- B、 要用力
- C、 稍微用力
- D、 要用大力

1287、婴幼儿 2~3 岁时,通过模仿操练习,以达到增强婴幼儿( D )的目的。

- A、 信心
- B、 主动性
- C、 模仿能力
- D、 体质

1288、为 1 岁前的婴幼儿选择发展听说能力的图片,图片最好( A )。

- A、 没有背景
- B、 有一些背景
- C、 有简单背景
- D、 有丰富背景

1289、( A )的婴幼儿视听神经尚未发育成熟,对动态的画面和快速的播音无法正常接收。

- A、 1 岁以前
- B、 2 岁以前
- C、 3 岁以前
- D、 4 岁以前

1290、从新生儿开始,就要坚持与宝宝说话,要采取( B )的姿势。

- A、 背靠背
- B、 面对面
- C、 近距离
- D、 远距离

1291、 婴幼儿依靠( D )去收集信息。

- A、 手
- B、 脚
- C、 身体
- D、 眼、耳、鼻、舌、身等感觉器官

1292、 在同一个时间, 宝宝的认知内容只能有( A )。

- A、 一个对象
- B、 二个对象
- C、 三个对象
- D、 四个对象

1293、 当宝宝边听音乐边自由地扭动身体时, 大人要( D )。

- A、 及时给予指导
- B、 及时地给予示范
- C、 不予理睬
- D、 参与到孩子的活动中, 及时喝彩鼓励

1294、 采用模仿表现法时, 宝宝的模仿动作( C )。

- A、 要逼真
- B、 要夸张
- C、 不要求精确
- D、 要专业

1295、 让宝宝模仿涂鸦时, 成人( C )。

- A、 既提供示范, 也进行纠正
- B、 要指出不正确的
- C、 只提供示范, 不进行纠正
- D、 不提供示范, 要手把手地教

1296、 婴幼儿用啼哭对不适作出反应是一种( C )的表现。

- A、 交往需要
- B、 表达需要
- C、 生存需要

D、 生理需要

1297、婴幼儿在学会爬行和步行以后,成人与婴幼儿间( A )的交流是婴幼儿学习、经验获得和认知发展的媒介。

- A、 情绪信号
- B、 表达信号
- C、 生存信号
- D、 生理信号

1298、当婴幼儿能够( C )后,要及时对他的言行加以肯定和赞赏。

- A、 自己走路
- B、 自己吃饭
- C、 听懂语言
- D、 自己玩玩具

1299、婴幼儿( D )需经历“妈妈阶段”、“同伴阶段”、“伴随行动”、“自我阶段”。

- A、 认识妈妈
- B、 认识家里人
- C、 认识陌生人
- D、 认识自己

1300、经常带婴幼儿到街心公园参与同伴的活动,与同伴一起背诵儿歌,做游戏等。可以( B )。

- A、 增进友谊
- B、 克服害羞
- C、 产生自卑
- D、 产生焦虑

1301、母亲在喂奶时可以一边喂,一边抚摸宝宝,有利于( A )的建立。

- A、 亲子关系
- B、 同伴关系
- C、 群体关系
- D、 朋友关系

1302、帮助婴幼儿准备与同伴一起玩的玩具,如积木、图书、水盆等,可以促进( B )的建立。

- A、 亲子关系
- B、 玩伴关系
- C、 群体关系
- D、 朋友关系

1303、在婴幼儿第一“反抗期”,对婴幼儿的合理需求,尤其是学习和探索环境的欲望要给予充分的满足。这是( A )。

- A、 转移注意法
- B、 合理满足法
- C、 故意冷淡法
- D、 后果惩罚法

1304、职业道德可以提高( B )的信誉度。

- A、 企业
- B、 行业
- C、 劳动者
- D、 个人

1305、职业道德是依据本职业的业务内容、活动条件、交往范围以及从业人员的( B )而制定的行为规范和道德准则。

- A、 感受能力
- B、 承受能力
- C、 接受能力
- D、 耐受能力

1306、育婴员将对婴幼儿的照料、保健、教育结合起来,通过日常生活中的活动或游戏来开发婴幼儿的潜能,促进婴幼儿的( D )发展。

- A、 心理
- B、 智力
- C、 情商
- D、 全面

1307、育婴员要根据每个个体不同阶段的要求和不同个体的差异,合理运用理论来解决( B )的不同问题。

- A、 相同时期的
- B、 不同时期的
- C、 某一时期的
- D、 特定时期的

1308、婴幼儿的身心发展有其独立的特征,并不是一个缩小的成人,所以在比例上( C )。

- A、 有差异
- B、 没有明显的变化
- C、 有明显的变化
- D、 没有差异

1309、学习简单地判断是非,是婴幼儿( D )。

- A、 学习的任务

- B、 游戏的任务
- C、 养育的任务
- D、 生长发育的任务

1310、根据小儿生长发育不同阶段的特点将小儿阶段分为7个时期:( D )。

- A、 胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期、少年期
- B、 新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期、少年期、青年期
- C、 新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期、少儿期、青春期
- D、 胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期、青春期。

1311、婴幼儿心理发展和生长发育是最快的时期,3岁时不仅有了相当的观察、记忆、思维能力,而且( B )也大大丰富了。

- A、 知识和技能
- B、 情绪和情感
- C、 审美和想象
- D、 表达和表现

1312、婴儿半岁左右能够坐起来的时候,可以较好地完成( A )。

- A、 眼手协调的活动
- B、 各种动作
- C、 各种活动
- D、 各种游戏

1313、( C )儿童开始认识到情绪和愿望满足的关系,通过愤怒发泄自己的愿望,并引起别人的注意。

- A、 0~1岁
- B、 0~2岁
- C、 2~3岁
- D、 3~6岁

1314、婴幼儿自己用言语来调节自己的行为,“我要”干什么,“我不要”干什么,这种具有明显独立性的行为更多的是在( C )阶段发生的。

- A、 0~1岁
- B、 1~2岁
- C、 2~3岁
- D、 3~4岁

1315、( C )阶段,是言语发展的早期阶段,大体可以分为两个时期:准备期和形成期。

- A、 0~1岁
- B、 0~2岁
- C、 0~3岁
- D、 3~4岁

1316、婴儿首先发展的是头部、躯体、双臂、双腿的动作,以后才是灵巧的手部小肌肉动作以及准确的视觉动作等,是动作发展( D )的规律。

- A、 从上部动作到下部动作
- B、 从整体动作到分化动作
- C、 从正向动作到反向动作
- D、 从大肌肉动作到小肌肉动作

1317、初生儿人称为子宫外的胎儿,是因为其( A )器官仍有不健全的地方。

- A、消化系统            B、呼吸系统            C、血液循环系统        D、泌尿系统

1318、婴幼儿基础代谢所需能量占总能量的( A )。

- A、 50%  
B、 40%  
C、 30%  
D、 20%

1319、脂肪的膳食来源有以下几种途径:( D )等。

- A、 动物油、植物油  
B、 奶油、蛋黄  
C、 肉类、鱼类  
D、 以上都是

1320、碳水化合物是( C )供应的主要来源。

- A、 蛋白质  
B、 脂肪  
C、 热能  
D、 维生素

1321、铁摄入不足,就会发生( C )而影响氧气的运输,影响生长发育。

- A、 再生障碍性贫血  
B、 地中海贫血  
C、 缺铁性贫血  
D、 溶血性贫血

1322、各种维生素有不同生理代谢功能,大多起调控作用,与酶关系密切,( D )。

- A、 但都能提供能量,不能构成人体组织部分  
B、 但都能提供能量,也能构成人体组织部分  
C、 但都不能提供能量,能构成人体组织部分  
D、 但都不能提供能量,也不能构成人体组织部分

1323、婴幼儿对水的需要量取决于( D )。

- A、 热量的需要  
B、 饮食的质量  
C、 与心脏、肾脏的浓缩功能有关  
D、 以上都是

1324、新生儿期若无母乳或母亲因病不能喂孩子,应选择( A )喂婴儿。

- A、婴儿配方奶粉      B、全牛奶      C、儿童成长奶粉      D、全羊奶

1325、正常新生儿出生 1 天接种的是( A )。

- A、卡介苗和乙肝疫苗  
B、麻疹疫苗  
C、肺炎疫苗  
D、百白破疫苗

1326、空腹饥饿时不宜打预防针,以免发生( C )等严重反应。

- A、抽搐  
B、过敏  
C、低血糖  
D、高热

1327、麻腮风疫苗可以预防( A )等三种传染病。

- A、麻疹、流行性腮腺炎、风疹  
B、荨麻疹、流行性腮腺炎、风疹  
C、麻疹、细菌性腮腺炎、风疹  
D、麻疹、流行性腮腺炎、白癜风

1328、婴幼儿期时体格生长发育最迅速,必须有丰富的易于消化的各种( D )满足需要。

- A、食物  
B、营养品  
C、高蛋白食物  
D、营养素

1329、新生儿头部已形成的乳痂,可用( D )涂抹浸润,再用棉球轻轻擦拭。

- A、花生油  
B、橄榄油  
C、芝麻油  
D、以上都是

1330、婴幼儿衣服有条件的( A )更换一次。

- A、每天                      B、隔天                      C、2-3天                      D、每周

1331、国家约定俗称的“三无”是指在包装上:( D )。

- A、无生产厂家名称                      B、无生产日期  
C、无生产地址                      D、以上都是

1332、使用电热设备应注意:( D )。

- A、应由自身的开关操作  
B、严禁用插头操作  
C、插座的容量应满足要求  
D、以上都是

1333、在意外紧急情况需要切断电源时,必须使用( A )剪断电线,不要用手硬拽电线。

- A、电工钳  
B、剪刀  
C、切菜刀  
D、以上都是

1334、有关安全标志说法正确的是:( C )。

- A、“黄色”用来标志指示、安全状态、通行  
B、“蓝色”用来标志注意危险  
C、“红色”表示禁止、停止的信息  
D、“绿色”表示指令、必须遵守的规定

1335、对于孩子来说,肝脏的解毒功能、排毒功能是( B )的过程。

- A、从弱到强  
B、从不完善到完善  
C、从不规律到规律  
D、从无到有

1336、根据不同月龄婴幼儿的发育特点,选择合适的食物( D ),使婴幼儿保持良好的食欲,获得充足的营养。

- A、品种  
B、质地  
C、口味  
D、以上都是

1337、( D )都不宜代替自来水作为人的主要饮用水。

- A、 碳酸饮料
- B、 营养保健型饮料
- C、 纯净水和矿泉水
- D、 以上都是

1338、若常饮易拉罐饮料,必然造成( C )摄入过多。

- A、 铜
- B、 铅
- C、 铝
- D、 锡

1339、专家认为,目前购买( D )的消费者普遍具有盲目性。

- A、 蒸馏水
- B、 纯净水
- C、 矿泉水
- D、 太空水

1340、长期进食精细食物,不仅会因减少( A )的摄入而影响神经系统发育。

- A、 B 族维生素          B、 维生素 C          C、 维生素 A          D、 维生素 D

1341、检测显示,膨化食品虽然口味鲜美,但从成分结构看,属于( D )的食品。

- A、 高油脂
- B、 高热量
- C、 低粗纤维
- D、 以上都是

1342、儿童不宜食用的营养滋补剂包括:含有( D )等营养品。

- A、 人参、鹿茸
- B、 阿胶
- C、 冬虫夏草、花粉
- D、 以上都是

1343、五颜六色汽水的主要成分是人工合成( D )、碳酸水,经加充二氧化碳气体制成的。

- A、 甜味剂
- B、 香精
- C、 色素
- D、 以上都是

1344、不得随意点火,禁止在( C )用火。

- A、仓库
- B、煤气站
- C、易燃易爆物品处
- D、加油站

1345、全国任何地区,向( C )报告火警的电话号码都是一样的。

- A、 公安机关
- B、 医疗急救
- C、 消防部门
- D、 交通急救

1346、着火时身处楼房的应( D )。

- A、 紧闭门窗
- B、 隔断火路
- C、 等待救援
- D、 以上都是

1347、在我国,未成年工是指年满( B )的劳动者。

- A、 0~16 周岁
- B、 16~18 周岁
- C、 12~16 周岁
- D、 12~18 周岁

1348、劳动者违反服务期约定的,应当按照约定向用人单位支付( D )。

- A、 一个月赔偿金
- B、 两个月赔偿金
- C、 三个月赔偿金
- D、 违约金

1349、各单位在录用女职工时,应当依法与其签订劳动(聘用)合同或者服务协议,劳动(聘用)合同或者服务协议中不得规定限制女职工( B )的内容。

- A、 恋爱
- B、 结婚、生育
- C、 着装打扮
- D、 生活习惯

1350、为新生儿生长发育、哺乳和护理提供医疗保健服务并建立联系卡,是( D )的内容。

- A、 母婴保健指导
- B、 孕妇、产妇保健
- C、 胎儿保健
- D、 新生儿保健

1351、隐私权是指未成年人享有的( B ),禁止他人非法干涉的权利。

- A、 个人缺点不被别人知晓
- B、 个人信息不被别人知晓
- C、 个人生活不被公众知晓
- D、 个人行为不被公众知晓

1352、 未成年所有人依法对自己的财产享有占有、 使用、 收益和处分的权利, 是未成年人享有的( A )。

- A、 财产所有权
- B、 受赠权
- C、 知识产权
- D、 继承权

1353、 在我国, 年满 16 周岁、 未满 18 周岁的未成年人, 如果完成了规定年限的( B ), 不再继续升学的, 依法可以从事有经济收入的劳动或者个体劳动的权利。

- A、 初等教育
- B、 义务教育
- C、 高等教育
- D、 职业教育

1354、 辅食是根据婴幼儿生长发育的不同阶段对各种营养素需求的增加, 而添加、 补充其他营养素的( B )。

- A、 主要食品
- B、 辅助食品
- C、 添加食品
- D、 补充食品

1355、 直接入口食品应当有( C )或者使用无毒、 清洁的包装材料。

- A、 隔离袋
- B、 塑料袋
- C、 小包装
- D、 包装袋

1356、 生产经营和使用食品添加剂, 必须符合食品添加剂使用( B )和卫生管理办法的规定。

- A、 条例
- B、 卫生标准
- C、 要求
- D、 条款

1357、 《中华人民共和国教育法》第二条指出: “在中华人民共和国境内的各级各类教育, 适用本法。” 所以 0~3 岁早期教育也( D )。

- A、 不适用本法

- B、 参照本法
- C、 不参照本法
- D、 适用本法

1358、国家建立科学的( D )系统。

- A、 学业
- B、 学习
- C、 学校
- D、 学制

1359、白萝卜富含维生素 C、蛋白质等营养成分,不具有( C )等保健作用。

- A、 止咳
- B、 润肺
- C、 抗感染
- D、 帮助消化

1360、科学研究发现,脑细胞的发育完善过程主要是在( B )中进行,睡眠有利于脑细胞的发育。

- A、 运动
- B、 睡眠
- C、 进餐
- D、 游戏

1361、根据婴幼儿不同月龄生理特点进行安排。随着年龄的增长,( C )。

- A、 年龄越大,吃、睡的时间和次数越多
- B、 年龄越大,吃、睡的时间不变,次数相对减少
- C、 年龄越小,吃、睡的时间和次数越多
- D、 年龄越小,吃、睡的时间不变,次数相对减少

1362、( D )就可以自己捧着杯子喝水,刚开始每次在杯里只倒一点水,然后试着用手扶着让孩子喝。

- A、 1 岁                      B、 1 岁半                      C、 2 岁                      D、 2 岁半

1363、脑细胞的发育完善过程主要是在睡眠中进行,( C )有利于脑细胞的发育。

- A、 游戏
- B、 进餐
- C、 睡眠
- D、 运动

1364、每天( D )喂饭,有利于营养的充分吸收。

- A、 定时
- B、 定点
- C、 定量
- D、 以上都是

1365、育婴员要对碗筷进行清洁消毒,可用( B )。

- A、 流动自来水冲洗净
- B、 流动自来水冲洗净, 再煮沸消毒 10 分钟
- C、 流动自来水冲洗净, 再用消毒水泡 10 分钟
- D、 以上都行

1366、( C )就学会自己拿勺吃饭。

- A、 半岁
- B、 1 岁
- C、 1 岁半
- D、 2 岁

1367、睡前给婴幼儿( D ),都有助于婴幼儿更好入睡。

- A、 清洗脸、脚和臀部
- B、 洗澡
- C、 按摩
- D、 以上都是

1368、培养婴幼儿( C )左右会用不同的方式表示排尿的需要。

- A、 半岁
- B、 1 岁
- C、 1 岁半
- D、 2 岁

1369、婴幼儿会( C )后,白天就不要用尿布。

- A、 坐
- B、 站
- C、 走
- D、 跑

1370、体重是衡量体格生长的重要指标,也是反映婴幼儿( B )状况最容易获得的灵敏指标。

- A、 生长发育
- B、 营养
- C、 消化功能
- D、 吸收功能

1371、新生儿出生时身长平均为 50cm,1 岁时为出生时的 1.5 倍,以后每年递增( C )cm。

- A、 3~4.5
- B、 4~5.5
- C、 5~7.5

D、 6~7.5

1372、( C )儿童头围为 54-58cm, 与成人接近。

- A、 13 岁                      B、 14 岁                      C、 15 岁                      D、 16 岁

1373、均值离差法划分为 6 个等级, 评价为“中下”的标准是:( D )。

- A、 为均值加 2 个标准差以上  
B、 为均值加 1 个标准差到均值加 2 个标准差之间  
C、 为均值到均值加 1 个标准差之间  
D、 均值到均值减 1 个标准差之间

1374、婴幼儿发热时, 应( D )。

- A、 经常开窗通风  
B、 保持室内空气新鲜  
C、 不要让孩子吹对流风  
D、 以上都是

1375、如室内闷热, 温度超过 35℃可用空调, 使温度不低于( B ), 且停止摆风, 最好不要用风扇吹婴幼儿。

- A、 30℃  
B、 28℃  
C、 26℃  
D、 25℃

1376、婴幼儿哭闹且见或( D )有包块, 可能为疝气嵌顿。

- A、 脐部  
B、 腹股沟  
C、 阴囊侧  
D、 以上都是

1377、容易吐奶的婴幼儿喂完奶让他( D )。

- A、 上身抬高  
B、 脸朝侧面躺  
C、 避免呕吐物堵塞气道  
D、 以上都是

1378、识别脱水要点:( D )。

- A、 精神疲乏
- B、 无力
- C、 粘膜干燥
- D、 以上都是

1379、 出生后 1 周内的新生儿, 平均每天排便 4 次;1 岁以上的幼儿约每天( C )。

- A、 4 次
- B、 3 次
- C、 2 次
- D、 1 次

1380、 服用药物引起便秘原因:( D )。

- A、 肠道内益生菌增加
- B、 肠内环境变号, 肠蠕动正常
- C、 pH 值下降
- D、 肠功能紊乱

1381、 ( B )吸水膨胀后可刺激肠道蠕动, 这样可减少便秘的发生。

- A、 碳水化合物
- B、 膳食纤维
- C、 蛋白质
- D、 脂肪

1382、 早产儿的生理性黄疸会( D )。

- A、 出现得较迟
- B、 程度严重
- C、 持续较久
- D、 以上都是

1383、 新生儿期要注意宝宝大便颜色的变化, 如果再加上身体皮肤颜色突然( C ), 就必须去看医生。

- A、 愈来愈黄
- B、 又白起来
- C、 又黄起来
- D、 黄白交替

1384、 新生儿从医院回家后, 无特殊情况, 如无脐部感染, 则可不用( B )。

- A、 保持脐部干燥
- B、 纱布覆盖
- C、 任何处理
- D、 75%酒精消毒脐部

1385、 脐带一旦被水或被尿液浸湿, 要马上应用( D )擦干, 然后用酒精棉签消毒。

- A、 干棉球
- B、 干净柔软的纱布
- C、 新的小方巾
- D、 以上都是

1386、细菌引起的尿布疹的症状:( C )。

- A、 皮肤会红一整片,好像烧坏了的皮肤
- B、 会出现病毒引起的尿布疹症状
- C、 皮肤会变红、破损,有细小的溃疡
- D、 发红的皮肤上散布红点

1387、湿疹常发于( C )。

- A、 躯干
- B、 四肢
- C、 头部和面部
- D、 皮肤皱褶处

1388、在有( A )的地方安放防护栏。

- A、 火
- B、 玩具
- C、 食物
- D、 儿童床

1389、不要把( D )装在曾经装无害药物和食品的瓶子里,如柠檬或果汁瓶等。

- A、 有毒物质
- B、 洗涤剂
- C、 消毒剂
- D、 以上都是

1390、家具一定要( D ),以防孩子把家具弄翻。

- A、 结实
- B、 固定好
- C、 靠墙
- D、 以上都是

1391、把( D )放在婴幼儿够不到的地方。

- A、 药物
- B、 剪刀
- C、 刀片

D、 以上都是

1392、教育幼儿懂得安全要点,明白什么是( B )并说明防范措施。

- A、 安全
- B、 危险
- C、 正确
- D、 错误

1393、在道路上行走要走人行道,没有人行道的道路要( A )行走。

- A、 靠路边
- B、 在路间
- C、 在非机动车道
- D、 在机动车道

1394、如果孩子心脏停跳,要立即实施胸外( A )。

- A、 心脏按压
- B、 心脏挤压
- C、 胸骨按压
- D、 胸骨挤压

1395、如果因诸多因素而未能及时注射疫苗,应本着的原则使用狂犬疫苗( C )。

- A、 “早注射比迟注射好,不注射比迟注射好”
- B、 “迟注射比早注射好,迟注射比不注射好”
- C、 “早注射比迟注射好,迟注射比不注射好”
- D、 “迟注射比早注射好,不注射比迟注射好”

1396、婴幼儿主被动操训练,可以直接让婴幼儿被动地改变( A ),为婴幼儿的运动机会提供更多的次数。

- A、 行为模式
- B、 动作模式
- C、 身体姿势
- D、 卧床姿势

1397、婴幼儿的主被动操适用于( A )的宝宝。

- A、 0~1岁                      B、 1~2岁                      C、 2~3岁                      D、 3~4岁

1398、婴幼儿的被动操屈伸运动,操作者握住婴儿( C )。

- A、 两手腕
- B、 两手臂

- C、 两腿部
- D、 两脚踝

1399、 婴幼儿的主被动操横托抱, 可以增加腹部压力, 促进( C )成熟和大便通畅。

- A、 肝脏
- B、 胆囊
- C、 肠胃
- D、 脾脏

1400、 在进行婴幼儿的主被动操起坐运动时, 成人拉引婴儿, 不要( D )让婴儿自己用力坐起来。

- A、 着急
- B、 用力
- C、 用力过轻
- D、 过于用力

1401、 在进行婴幼儿的主被动操起立运动时, 让婴儿( C )。

- A、 直接起立
- B、 先立再跪
- C、 先跪再立
- D、 跪着不立

1402、 在进行婴幼儿的主被动操弯腰运动时, 在婴儿前方放一玩具, 使婴儿弯腰前倾拣桌(床)上玩具。拣起玩具后成( C )。

- A、 弯腰状态
- B、 后仰状态
- C、 直立状态
- D、 前弓状态

1403、 婴幼儿 2~3 岁时, 通过模仿操训练, 以达到增强婴幼儿( D )的目的。

- A、 信心
- B、 主动性
- C、 模仿能力
- D、 体质

1404、 为婴幼儿选择发展听说能力的( A )的图书没有背景, 只有人物的动态和表情, 排除干扰。

- A、 1 岁以前
- B、 1~2 岁
- C、 2~3 岁
- D、 3~4 岁

1405、 婴幼儿的艺术表现游戏与成人的艺术表现不同, 没有质量的要求, 只是( C )。

- A、 闹着玩的
- B、 随便做做
- C、 娱乐身心
- D、 开玩笑而已

1406、 婴幼儿的先天情绪反应只有在( D ), 才能发挥其适应的作用。

- A、 自言自语中
- B、 自娱自乐中
- C、 自我陶醉中
- D、 与成人的应答中

1407、 婴幼儿从出生到 1 岁期间是情绪萌发期, ( C ) 的婴幼儿会对新鲜事物敏感, 趋向于探索外界, 为智力发展打下良好基础。

- A、 经常生气
- B、 经常哭泣
- C、 经常快乐
- D、 经常发愣

1408、 帮助婴幼儿准备与同伴一起玩的玩具, 如积木、 图书、 水盆等, 可以促进( B )的建立。

- A、 亲子关系
- B、 玩伴关系
- C、 群体关系
- D、 朋友关系

1409、 在与他人交往时, 训练和鼓励婴幼儿作完整的自我介绍, 并且能够倾听他人的介绍, 这有利于增进其( C )。

- A、 动手能力
- B、 自理能力
- C、 交往能力
- D、 观察能力

1410、 职业道德是指从事一定职业的人, 在工作或劳动过程中, 应该遵循的( C )道德规范的总和。

- A、 与其职业活动相关的
- B、 与其活动紧密联系的
- C、 与其职业活动紧密联系的
- D、 与其职业活动紧密相关的

1411、 婴幼儿头占身长( A )。

- A、 1/4
- B、 1/2

- C、 1/8
- D、 1/6

1412、学习走路、学习食用固体食物、学习说话、学习控制排泄机能,是婴幼儿( B )。

- A、 学习的任务
- B、 生长发育的任务
- C、 养育的任务
- D、 游戏的任务

1413、( C )具有以下特点:乳牙逐渐出齐,食物转换但消化功能弱;语言、动作及思维发展迅速,活动范围扩大,但危险识别和自身保护力差,易发生事故;免疫力仍低,传染病发生率高。

- A、 新生儿期
- B、 婴幼儿期
- C、 幼儿期
- D、 学龄前期

1414、婴幼儿生长发育一般遵循( C )发展的规律。

- A、 由上到下、由近到远、由里到外
- B、 由下至上、由近到远、由粗到细
- C、 由上到下、由近到远、由粗到细
- D、 由上到下、由近到远、由细到粗

1415、婴儿在视觉的调节下,手在视野范围内完成操纵、摆弄物品的活动,这是利用( B )综合认识物品的特性。

- A、 感觉能力
- B、 知觉能力
- C、 动手能力
- D、 视觉能力

1416、感知动作思维是指思维过程离不开( D )的思维方式。

- A、 实物
- B、 表象
- C、 情景
- D、 直接感知的事物和操纵事物的动作

1417、( B )在人一生的发展中起着至关重要的作用。它不排斥亲子关系,也不能由亲子关系来代替。

- A、 亲子关系
- B、 玩伴交往关系
- C、 朋友关系
- D、 群体关系

1418、( C )婴幼儿在不断扩大生活范围、不断增长社会经验和能力,不断发展言语的过程中,逐步把握 作为一个社会人的自我。

- A、 从出生到一岁
- B、 从一岁到两岁
- C、 从第二年到满 3 岁
- D、 从 3 岁到 4 岁

1419、( A )和情感是人对客观事物是否符合自身的需要而产生的态度的体验。

- A、 情绪
- B、 意志
- C、 记忆
- D、 气质

1420、婴幼儿在玩弄玩具、摆弄物品、奔向某个目标的爬行和走路中,形成初步的运动能力的掌握和运动的目的性,为婴幼儿( B)的产生准备了条件。

- A、 想象力
- B、 意志力
- C、 创造力
- D、 协调力

1421、婴幼儿气质特征是儿童个性发展的最原始的基础,其特点是( C)。

- A、 不受先天影响
- B、 跟后天无关
- C、 具有先天的性质、受后天环境、教育条件的影响
- D、 受先天影响

1422、( C )为言语的初步发展期。包括词汇的发展,句式的掌握和口语的表达能力等阶段。

- A、 0~1 岁
- B、 1~2 岁
- C、 1~3 岁
- D、 3~4 岁

1423、婴儿俯卧在平台上,他首先出现的动作是抬头,其后才逐步发展到俯撑、翻身、坐、爬、站立、行走。这是动作发展( A)的规律。

- A、 从上部动作到下部动作
- B、 从整体动作到分化动作
- C、 从粗大动作到精细动作

D、 从大肌肉动作到小肌肉动作

1424、 婴儿体内营养素的(C )。

- A、 储备量相对大, 适应能力也低
- B、 储备量相对小, 适应能力也高
- C、 储备量相对小, 适应能力也低
- D、 储备量相对大, 适应能力也高

1425、 产热营养素包括( C)。

- A、 碳水化合物、膳食纤维、水
- B、 无机盐微量元素、维生素
- C、 蛋白质、脂肪、碳水化合物
- D、 以上都是

1426、 正常婴幼儿每日摄入碳水化合物产生的热能占总能量的(C )。

- A、 30%
- B、 40%
- C、 50%
- D、 60%

1427、 婴幼儿蛋白质过量不会导致(B )。

- A、 腹泻、酸中毒
- B、 体重和身高增加缓慢
- C、 高渗性脱水、发热
- D、 血清尿素和氨升高

1428、 婴幼儿脂肪过量会导致(D )。

- A、 食欲减退
- B、 消化不良
- C、 发生酸中毒
- D、 以上都是

1429、 锌缺乏时会引起( D) 。

- A、 生长发育迟缓
- B、 食欲不振
- C、 免疫力下降
- D、 以上都是

1430、 脂溶性维生素包括( A) 。

- A、维生素 A、D、E、K                      B、维生素 C  
C、叶酸    D、泛酸

1431、膳食纤维来源于( B )。

- A、 动物性食物  
B、 植物性食物  
C、 水  
D、 以上都是

1432、幼儿期孩子们体格发育速度放慢,但脑的发育加快,因此饮食中应注意(A )的供给。

- A、 脂肪  
B、 普通蛋白质  
C、 优质蛋白质  
D、 碳水化合物

1433、儿童计划免疫包括基础免疫和加强免疫,( D )不是相应传染病发生的关键措施。

- A、 预防  
B、 控制  
C、 消灭  
D、 治疗

1434、如果过多地注射疫苗,反而会使免疫力降低,甚至无法产生免疫力,出现(C )。

- A、 免疫抑制  
B、 免疫消失  
C、 免疫麻痹  
D、 免疫消退

1435、打针后( D)应避免剧烈活动。

- A、 一周内  
B、 4~5 天  
C、 3~4 天  
D、 2~3 天

1436、乙肝疫苗接种对象接种月龄错误的是(C )。

- A、 0 个月  
B、 一个月  
C、 四个月  
D、 六个月

1437、自我生活能力包括( D)等。

- A、 睡眠、进食
- B、 排便、沐浴
- C、 游戏、户外活动
- D、 以上都是

1438、婴幼儿洗澡时室内温度保持在( C )。

- A、 18~22℃
- B、 22~25℃
- C、 28℃左右
- D、 30~32℃

1439、婴幼儿皮肤护理的注意事项:( A )。

- A、 奶量充足时口腔是清洁的,禁忌用纱布擦洗口腔黏膜
- B、 奶量充足时口腔是有菌的,禁忌用纱布擦洗口腔黏膜
- C、 奶量充足时口腔是清洁的,可以用纱布擦洗口腔黏膜
- D、 奶量充足时口腔是有菌的,可以用纱布擦洗口腔黏膜

1440、婴幼儿乳痂的处理:( A )。

- A、 新生儿头部皮脂腺分泌较旺盛,应经常清洗
- B、 新生儿头部皮脂腺分泌不旺盛,应经常清洗
- C、 新生儿头部皮脂腺分泌较旺盛,不用经常清洗
- D、 新生儿头部皮脂腺分泌不旺盛,不用经常清洗

1441、电线断线落地,不要靠近,6~10kV 的高压线,应至少离开电线落地点( C )远,并及时报告有关部门修理。

- A、 3m
- B、 5m
- C、 10m
- D、 15m

1442、关于安全标志说法错误的是:( A )。

- A、 “蓝色”用来标志指示、安全状态、通行
- B、 “黄色”用来标志注意危险
- C、 “红色”表示禁止、停止的信息
- D、 “蓝色”表示指令、必须遵守的规定

1443、食品安全指食品对人体健康不造成任何( D )危害。

- A、 急性
- B、 亚急性
- C、 慢性
- D、 以上都是

1444、有一些食品,细菌超标,对孩子一过性的影响可表现为(D )。

- A、 呕吐
- B、 腹泻
- C、 体重不增长
- D、 以上都是

1445、亲手为宝宝制作食品,尽可能选用新鲜的富含的食物(B )。

- A、 无机物质
- B、 有机物质
- C、 矿物质
- D、 维生素

1446、坚果类食品(B )含量高,质地坚硬,婴幼儿不易嚼碎,不易消化。

- A、 蛋白质
- B、 脂肪
- C、 碳水化合物
- D、 矿物质

1447、过食冷饮会引起儿童(D )。

- A、 胃肠道内温度骤然下降
- B、 局部血液循环减缓
- C、 影响对食物中营养物质的吸收和消化
- D、 以上都是

1448、有调查显示,易拉罐装饮料比瓶装饮料铝的含量高出( B)倍。

- A、 5~6
- B、 4~5
- C、 3~6
- D、 2~5

1449、长期进食精细食物,不仅会因减少 B 族维生素的摄入而影响神经系统发育,还有可能因为(B )缺乏“株连”视力。

- A、 铅元素
- B、 铬元素
- C、 铝元素
- D、 铜元素

1450、咖啡因还会破坏儿童体内的维生素,引起(B )。

- A、 维生素 C 缺乏症
- B、 维生素 B1 缺乏症
- C、 维生素 B2 缺乏症
- D、 维生素 B6 缺乏症

1451、补品中含有(B ),对儿童正常的生理代谢有影响。

- A、 激素和微量元素
- B、 激素和微量活性物质
- C、 优质蛋白质和微量元素
- D、 优质蛋白和微量活性物质

1452、儿童食物过敏者中大约(A )是由偏食造成的。

- A、 30%
- B、 40%
- C、 50%
- D、 60%

1453、食品中的添加剂“三精”指(D)。

- A、 糖精
- B、 香精
- C、 食用色精
- D、 以上都是

1454、不得带(B )等火种。

- A、 酒精
- B、 火柴或打火机
- C、 汽油
- D、 鞭炮

1455、炒菜时油锅起火,迅速将锅盖紧紧盖上,使锅里的油火因缺氧而熄灭,不可用(A )扑救。

- A、 水
- B、 土
- C、 沙泥
- D、 干粉灭火器

1456、如果发现火灾发生,最重要的是报警,这样才能,(D)。

- A、 及时扑救
- B、 控制火势
- C、 减轻火灾造成的损失
- D、 以上都是

1457、劳动者的权利包括(B)等内容。

- A、 履行劳动合同,提高职业技能
- B、 平等就业和选择职业、取得劳动报酬、休息、休假
- C、 执行劳动安全卫生规程
- D、 遵守劳动职业道德

1458、劳动者竞争就业原则、照顾特殊群体人员的原则、禁止未成年人就业的原则是(D )的内容。

- A、 劳动权利
- B、 劳动义务
- C、 劳动争议
- D、 劳动就业原则

1459、在我国,未成年工是指年满( B)的劳动者。

- A、 0~16 周岁
- B、 16~18 周岁
- C、 12~16 周岁
- D、 12~18 周岁

1460、社会保险主要包括:(D )。

496

- A、 劳动保险、医疗保险
- B、 工伤保险、失业保险
- C、 养老保险、医疗保险
- D、 养老保险、工伤保险、医疗保险和失业保险

1461、用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具(B ),并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险 关系转移手续。

- A、 此人曾在本单位工作的证明
- B、 解除或者终止劳动合同的证明
- C、 失业证明
- D、 就业证明

1462、国家保障妇女享有与男子平等的(C )。

- A、 人生权利
- B、 经济权利
- C、 政治权利
- D、 生存权利

1463、对准备结婚的男女双方,可能患影响结婚和生育的疾病进行医学检查是(D )的内容。

- A、 婚前卫生指导
- B、 婚前卫生咨询
- C、 婚前心理指导
- D、 婚前医学检查

1464、《母婴保健法》第二十八条规定:各级(C )应当采取措施,加强母婴保健工作,提高医疗保健服务水平,积极防治由环境因素所致严重危害母亲和婴儿健康的地方性疾病,促进母婴健康的发展。

- A、 卫生部门
- B、 保健院
- C、 人民政府
- D、 计生部门

1465、未成年人有权决定、使用和依照规定由(D )向户口登记机关申请变更登记后的自己的姓名。

- A、 祖父母
- B、 外祖父母
- C、 亲戚
- D、 父母、收养人

1466、未成年人接受的赠款、赠物归属未成年人所有。任何人,包括未成年人的父母或其他监护人,不得以该未成年人未成年为由将该款、物据为己有。是未成年人享有的(B)。

- A、 财产所有权
- B、 受赠权
- C、 知识产权
- D、 继承权

1467、专供婴幼儿的主、辅食品必须符合(D)卫生行政部门制定的营养、卫生标准和管理办法的规定。

- A、 县级
- B、 市级
- C、 省级
- D、 国务院

1468、国家实行(B)、初等教育、中等教育、高等教育的学校教育制度。

- A、 幼儿教育
- B、 学前教育
- C、 小学教育
- D、 义务教育

1469、(C),婴幼儿过渡到以谷类食品为主食。

- A、 6 个月后
- B、 8 个月后
- C、 1 周岁后
- D、 1 周半后

1470、对 0~3 个月的婴儿来讲,提倡(A)喂养,按需哺乳。

- A、 纯母乳
- B、 母乳
- C、 混合

D、 人工

1471、生长激素的分泌有其特定的昼夜规律。每天夜间 22 点至凌晨是分泌的高峰期,分泌量可占全天的(C )。

- A、 5%~10%
- B、 10%~20%
- C、 20%~40%
- D、 30%~50%

1472、进餐过程要保持婴幼儿(D )。

- A、 情绪愉快
- B、 专心进食
- C、 细嚼慢咽
- D、 以上都是

1473、(C )吃饭动作逐渐协调,可独立吃饭。

- A、 1~1.5 岁
- B、 1.5~2 岁
- C、 2~3 岁
- D、 3~4 岁

1474、学习使用餐具是一个循序渐进的过程, (D )。

- A、 一定要有耐性
- B、 不要随便责怪婴幼儿
- C、 应给予必要的鼓励
- D、 以上都是

1475、创造一个适宜的睡眠环境:(D )。

- A、 居室安静
- B、 光线柔和
- C、 室温控制在 25℃左右
- D、 以上都是

1476、婴幼儿(D )后要穿整裆裤。

- A、 半岁
- B、 1 岁
- C、 1 岁半
- D、 2 岁

1477、大脑发育不全时,可出现(D )。

- A、 智力低下
- B、 脑瘫
- C、 大头娃娃
- D、 小头畸形

1478、新生儿出生时胸围小于头围 1~2cm,一般在(B )胸围赶上头围。

- A、 1 岁前
- B、 1 岁后
- C、 1.5 前
- D、 1.5 岁后

1479、新生儿出生时坐高平均为(B ), 占身长的 66%。

- A、 32cm
- B、 33cm
- C、 34cm
- D、 35cm

1480、体重的测量以为单位, 准确记录至小数点后 2 位(D )。

- A、 磅
- B、 斤
- C、 克
- D、 千克

1481、胸围的测量: 已发育的女童软尺经乳头上方(C )肋骨处。

- A、 第二
- B、 第三
- C、 第四
- D、 第五

1482、婴幼儿低热范围:( A )。

- A、 37.5~38℃
- B、 37.5~38.2℃
- C、 37.5~38.5℃
- D、 37.5~39℃

1483、进行物理降温的方式:( D )。

- A、 温水浴

- B、 温水擦浴
- C、 酒精擦浴
- D、 以上都是

1484、如果婴幼儿的体温超过(C ),可以采取用温水不间断地擦身体降温,并且每隔 10 分钟量一次体温。

- A、 37.4℃
- B、 38.4℃
- C、 39.4℃
- D、 40.0℃

1485、如果喂奶后 1 小时以上仍出现呕吐,且伴有(D )等,可能伴有内、外科疾病,应到医院就诊。

- A、 呕出物酸臭
- B、 食欲减退
- C、 疲乏
- D、 以上都是

1486、胆道蛔虫症表现为, ( A)。

- A、 面色苍白或带黄
- B、 偶尔发作
- C、 无绞痛
- D、 不呕吐

1487、(B )个月的宝宝,一个劲哭泣时,可能是肚子内空气太多引起的腹痛。

- A、 0~1
- B、 0~3
- C、 2~5
- D、 3~5

1488、便秘原因:( D)。

- A、 饮食因素
- B、 习惯因素
- C、 疾病因素
- D、 以上都是

1489、婴儿嘴里长白膜多见于鹅口疮,是(B )感染所致。

- A、 金黄色葡萄球菌
- B、 白色念珠菌
- C、 白喉杆菌
- D、 百日咳杆菌

1490、早产儿的生理性黄疸会(D )。

- A、 出现得较迟
- B、 程度重
- C、 持续较久
- D、 以上都是

1491、不要让(D )捂住脐部,以免发生新生儿脐炎。

- A、 湿衣服
- B、 尿布
- C、 纱布
- D、 以上都是

1492、如果( D),那很可能是肚脐出现了感染。

- A、 肚脐的渗出液像脓液或有恶臭味
- B、 肚脐和周围皮肤变得很红
- C、 用手摸起来感觉皮肤发热
- D、 以上都是

1493、尿布疹护理方法:(D )。

- A、 大小便后及时换尿布
- B、 选择适宜的尿布
- C、 让小屁股保持干燥
- D、 以上都是

1494、在浴室使用( D)。

- A、 防滑垫
- B、 防滑地板
- C、 安全抓手
- D、 以上都是

1495、家具角一定为( C),如果不是圆角,要安上塑料防护桌角。

- A、 锐角形
- B、 直角形
- C、 圆形
- D、 三角形

1496、幼儿进行户外活动时应做到(D )。

- A、 少晒太阳
- B、 运动量越大越好
- C、 尽量自由玩耍

D、 做好安全防护

1497、 穿越马路要(D )。

- A、 走人行横道线
- B、 自觉走过街天桥
- C、 走地下通道
- D、 以上都是

1498、 乘车时不要把(D )伸出手窗外, 以免被对面来车或路边树木等刮伤。

- A、 头
- B、 手
- C、 胳膊
- D、 以上都是

1499、 要与婴幼儿说(D ), 这样容易使婴幼儿明白语言与事物之间的联系, 并容易记住。

- A、 没见过的事
- B、 稀奇的事
- C、 不在眼前的东西
- D、 看得见的东西和正在做的事情

1500、 如果孩子心脏停跳, 要立即实施胸外(A )。

- A、 心脏按压
- B、 心脏挤压
- C、 胸骨按压
- D、 胸骨挤压

1501、 常见异物类型有( D)等。

- A、 花生米、瓜子
- B、 豆类、糖球
- C、 小瓶盖、塑料
- D、 以上都是

1502、 婴幼儿被宠物咬伤后, 要及时注射(A ), 以行之有效地预防发病。

- A、 狂犬疫苗
- B、 水痘疫苗
- C、 腮腺炎疫苗
- D、 风疹疫苗

1503、 婴幼儿的主被动操横托抱动作要领是当身体下降到(A ), 出现本能的挺胸动作后, 双手向一起靠拢。

- A、 一定程度
- B、 极度程度
- C、 弯曲程度
- D、 被动程度

1504、 婴幼儿的主被动操横托抱动作要领是左手托在婴幼儿的(A ), 再用右手托住婴儿的臀部。

- A、 颈背部
- B、 肩部
- C、 头部慢
- D、 胸部

1505、 为婴幼儿选择发展听说能力的图片, 图片不提倡卡通图, 婴幼儿(C ), 并能与实际的物品配对。

- A、 容易混淆
- B、 不易混淆
- C、 容易辨认
- D、 不易辨认

1506、 为(C )婴幼儿选择的图书内容可以描述以动物为主人公或以人物为主人公的有趣的故事, 每页码 以完整句子为单位。

- A、 1 岁以前
- B、 1~2 岁
- C、 2~3 岁
- D、 3~4 岁

1507、 给婴幼儿玩节律游戏也可以用简单的节奏乐器进行游戏, 如( D), 以增加气氛和提高婴幼儿参加 活动的乐趣。

- A、 使用大型架子鼓
- B、 使用乐队的大鼓
- C、 使用专用的乐器
- D、 铃铛、串铃、响板、沙锤等

1508、 婴幼儿的认知游戏相同的内容需要( D)。

- A、 一次搞定
- B、 不需重复
- C、 偶尔复习
- D、 反复进行

1509、 宝宝在优美的韵律中感受节奏的美, 通过( B), 可以让宝宝充满自信和快乐。

- A、 思维
- B、 肢体的运动
- C、 想象
- D、 语言

1510、成人播放歌谣或儿歌,每次播放的时间不宜太长,最多不超过(A ),避免听觉疲劳。

- A、10 分钟      B、20 分钟      C、30 分钟      D、40 分钟

1511、采用模仿表现法时,宝宝的模仿动作只要(B )就可以了。

- A、标准  
B、有模仿的意识  
C、规范  
D、专业

1512、让宝宝自由地涂鸦时,第一次就要告诉宝宝(C),否则就要把纸笔收起来。

- A、不能随便乱画  
B、要按要求画  
C、不能涂到纸以外的其他地方  
D、想怎么画就怎么画

1513、让宝宝模仿涂鸦时,成人手把手地教,会让宝宝(D)。

- A、增强信心  
B、更加自信  
C、提高绘画水平  
D、失去信心

1514、婴幼儿与生俱来地具有(B)的能力,是在神经系统和脑中预置并模式化的先天情绪反应。

- A、语言表达  
B、情绪反应  
C、动作模式  
D、与人应答

1515、刚刚学步的婴儿与母亲的感情依恋驱使他们在房间里(A)母亲,陌生人接近的警觉和恐惧迫使他们躲避或寻求庇护。

- A、追随着  
B、摆脱  
C、靠近  
D、远离

1516、在婴幼儿刚会走路时摔倒后要鼓励不哭;在遇到别人抢夺玩具时学会暂时让步;在别的小朋友哭时产生同情心,这是培养婴儿的(D)。

- A、独占和自私

- B、 爱心
- C、 冷漠
- D、 安慰和宽容

1517、3岁左右的婴幼儿,随着(A)的发展,可以产生带有简单主题和角色的游戏,能够反映婴幼儿模仿成人社会生活情节的想象活动。

- A、 经验和言语
- B、 动作
- C、 认知
- D、 情感

1518、1岁半的婴幼儿能集中注意(A)。

- A、 2~3分钟
- B、 3~5分钟
- C、 5~8分钟
- D、 8~10分钟

1519、2岁左右,可以有意识地回忆以前的事件,这种能力的出现和发展与(D)发展密切相关。

- A、 动作的
- B、 感觉的
- C、 知觉的
- D、 言语的

1520、3岁及3岁以上小儿量身高(立位高)读刻度,记录至(A)。

- A、 0.1cm
- B、 0.2cm
- C、 0.25cm
- D、 0.5cm